

# アセトアミノフェン錠「マルイシ」

## を服用される方へ

服用してください



お・水・と・一・緒・に

飲み忘れたら

- ⚠️ 気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。  
※ただし、次に飲む時間が近い場合は飲まずに、次に飲む時間から飲んでください。
- ⚠️ 1度に2回分の服用はしないでください。

必ず医師や薬剤師の指示を守って  
正しく服用してください。



## アセトアミノフェンとは…

熱を下げ、痛みをやわらげる効果があります。  
通常、頭痛、腰痛症、歯痛、変形性関節症などの鎮痛、急性上気道炎や小児科領域の解熱・鎮痛などに使用されます。

## 次のような方は

### 服用前に医師・薬剤師に相談してください

- 肝臓病、または以前に肝臓病にかかったことがある方
- アルコールを日常的に多く飲む方
- 気管支喘息のある方
- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 消化性潰瘍、血液の異常、肝障害、腎障害、心機能不全、アスピリン喘息またはその既往歴がある方



他のお薬の服用を考  
えている方は、市販の風邪  
薬・痛み止めなどにもア  
セトアミノフェンが含ま  
れている場合がありますの  
で、必ずお伝えください。

注) 成人の痛みの緩和に用いる場合、1日4000mgを超えて服用することはできません。

発疹、発赤、発熱、息苦しさ、けん怠感、その他気になる症状があらわれた場合は、医師・薬剤師に相談してください。

詳細はPMDA(医薬品医療機器総合機構)のホームページに掲載されている「患者向医薬品ガイド」を参照ください。