

販売中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、弊社製品『D-ソルビトール原末「マルイシ」500g』につきまして、長年にわたりお引き立ていただきましたが、諸般の事情によりやむなく販売を中止させていただきますこととなりました。

ご迷惑をおかけし誠に恐縮ではございますが、何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申しあげます。

謹白

記

【販売中止品】

統一商品コード	品名	包装	薬価(円)	販売中止予定時期
211-135522	D-ソルビトール原末「マルイシ」	500g	12.60 /10g	2021年11月頃

(出荷状況により若干前後いたします)

【経過措置告示年月】

2022年3月(予定)

【経過措置期間満了日】

2023年3月31日(予定)

【同種同効品】

統一商品コード	品名	包装	薬価(円)	製造販売元
211-135928	D-ソルビトール内用液6.5% 「マルイシ」	500mL	10.20 /10mL	丸石製薬株式会社

【参考】

下線部：相違箇所

販売名	D-ソルビトール原末「マルイシ」	D-ソルビトール内用液6.5%「マルイシ」
効能・効果	○消化管のX線造影の迅速化 ○消化管のX線造影時の便秘の防止	○消化管のX線造影の迅速化 ○消化管のX線造影時の便秘の防止
	○経口的栄養補給	○経口的栄養補給
用法・用量	X線造影剤に添加して経口投与する。 添加量はX線造影剤中の硫酸バリウム100gに対してD-ソルビトールとして10～20gとする。	X線造影剤に添加して経口投与する。 添加量はX線造影剤中の硫酸バリウム100gに対して本品12～24mL(D-ソルビトールとして10～20g)とする。
	必要量を粉末あるいは水溶液として経口投与する。	必要量を経口投与する。

*用法・用量が一部異なっておりますので、詳細につきましては、製品添付文書等を必ずご確認ください。

以上