アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。

アセトアミノフェン錠「マルイシ」（200mg・300mg・500mg）をご使用される患者さんへ

わずかにピンク色に変色することがありますが、
品質や効果はこれまでと変わりありません。