

短時間作用型 β_1 遮断剤

ブレビブロック[®]注 100mg

【用法・用量】

- 通常、成人には1回 0.1mL/kg (エスモロール塩酸塩として 1mg/kg) を30秒間で心電図の連続監視下に静脈内に投与する。
なお、年齢、症状により適宜減量する。
- 引き続き持続投与を行う場合は、0.9mL/kg/時 (150 μ g/kg/分) の投与速度で持続静脈内投与を開始し、適宜投与速度を調節し、目標とする心拍数を維持する。
なお、持続投与は、年齢、症状により適宜低用量から開始する。

- これまで通り、急速静脈内投与の繰り返し投与も可能 (ただし投与間隔は5分以上置く)
- 持続投与を行う場合は、先ず急速静脈内投与を行う (持続投与は150 μ g/kg/分から開始)

投与量换算表

		用法・用量						
投与時期		单 回	持 続					
投 与 量		0.1mL/kg	0.3mL/kg/時 (50 μ g/kg/分)	0.6mL/kg/時 (100 μ g/kg/分)	0.9mL/kg/時 (150 μ g/kg/分)	1.2mL/kg/時 (200 μ g/kg/分)	1.5mL/kg/時 (250 μ g/kg/分)	1.8mL/kg/時 (300 μ g/kg/分)
体 重	30kg	3mL	9mL/時	18mL/時	27mL/時	36mL/時	45mL/時	54mL/時
	40kg	4mL	12mL/時	24mL/時	36mL/時	48mL/時	60mL/時	72mL/時
	50kg	5mL	15mL/時	30mL/時	45mL/時	60mL/時	75mL/時	90mL/時
	60kg	6mL	18mL/時	36mL/時	54mL/時	72mL/時	90mL/時	108mL/時
	70kg	7mL	21mL/時	42mL/時	63mL/時	84mL/時	105mL/時	126mL/時
	80kg	8mL	24mL/時	48mL/時	72mL/時	96mL/時	120mL/時	144mL/時
	90kg	9mL	27mL/時	54mL/時	81mL/時	108mL/時	135mL/時	162mL/時
	100kg	10mL	30mL/時	60mL/時	90mL/時	120mL/時	150mL/時	180mL/時