

チアミトール<sup>®</sup>消毒用液10<sup>W</sup>/<sub>V</sub>% チアミトール<sup>®</sup>消毒用液50<sup>W</sup>/<sub>V</sub>%

使用濃度	チアミトール消毒用液10 <sup>W</sup> / <sub>V</sub> %			チアミトール消毒用液50 <sup>W</sup> / <sub>V</sub> %		
	希釈倍数	全量1L調製		希釈倍数	全量1L調製	
		10 <sup>W</sup> / <sub>V</sub> %液 必要量	希釈水		50 <sup>W</sup> / <sub>V</sub> %液 必要量	希釈水
0.01%	1000倍	1 mL	999mL	5000倍	0.2mL	999.8mL
0.02%	500倍	2 mL	998mL	2500倍	0.4mL	999.6mL
0.025%	400倍	2.5mL	997.5mL	2000倍	0.5mL	999.5mL
0.05%	200倍	5 mL	995mL	1000倍	1 mL	999mL
0.1%	100倍	10mL	990mL	500倍	2 mL	998mL
0.2%	50倍	20mL	980mL	250倍	4 mL	996mL

- 希釈液として塩類含量の多い水又は硬水を用いないでください。  
深い創傷又は眼に使用する希釈水溶液は、調製後滅菌処理してください。  
〔詳細は【使用上の注意】1. 重要な基本的注意、4. 適用上の注意 参照〕

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量	希釈倍数	
		10 <sup>W</sup> / <sub>V</sub> %液	50 <sup>W</sup> / <sub>V</sub> %液
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンザルコニウム塩化物0.05～0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。	100～200倍	500～1000倍
手術部位（手術野）の皮膚の消毒	手術前局所皮膚面をベンザルコニウム塩化物0.1%溶液で約5分間洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.2%溶液を塗布する。	0.1%：100倍 0.2%：50倍	0.1%：500倍 0.2%：250倍
手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。	400～1000倍	2000～5000倍
感染皮膚面の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。	1000倍	5000倍
医療機器の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液中で15分間煮沸する。	100倍	500倍
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	ベンザルコニウム塩化物0.05～0.2%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。	50～200倍	250～1000倍
腔洗浄	ベンザルコニウム塩化物0.02～0.05%溶液を用いる。	200～500倍	1000～2500倍
結膜囊の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.05%溶液を用いる。	200～1000倍	1000～5000倍

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - (4) 深い創傷又は眼に使用する希釈水溶液は、調製後滅菌処理すること。
4. 適用上の注意
  - (2) その他 1) 調製方法：
    - ア. 希釈液として塩類含量の多い水又は硬水を用いないこと。