

## ホリゾン錠 2mg、ホリゾン錠 5mg、ホリゾン散 1%

### 【この薬は？】

販売名	ホリゾン錠 2mg Horizon Tablets 2mg	ホリゾン錠 5mg Horizon Tablets 5mg	ホリゾン散 1% Horizon Powder 1%
一般名	ジアゼパム Diazepam		
含有量	2mg (1錠中)	5mg (1錠中)	10mg (1g中)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗不安薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳のベンゾジアゼピン受容体に作用し、脳が興奮している状態をしずめ、不安や緊張をやわらげるはたらきがあります。
- ・次の病気の人に処方されます。

**神経症における不安・緊張・抑うつ**

**うつ病における不安・緊張**

**心身症（消化器疾患、循環器疾患、自律神経失調症、更年期障害、腰痛症、頸肩腕症候群）における身体症候並びに不安・緊張・抑うつ**

**下記疾患における筋緊張の軽減**

**脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛**

**麻酔前投薬**

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・急性閉塞隅角緑内障のある人
  - ・重症筋無力症のある人
  - ・リトナビル（HIV プロテアーゼ阻害剤）を投与中の人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
  - ・心臓に障害のある人、肝臓に障害のある人、腎臓に障害のある人
  - ・脳に器質的障害のある人
  - ・乳児・幼児
  - ・高齢の人
  - ・衰弱している人
  - ・中等度または重篤な呼吸不全のある人
- この薬には併用してはいけない薬[HIV プロテアーゼ阻害剤（リトナビル（ノービア））]や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。  
通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

#### [不安・緊張・抑うつ（成人）の場合]

販売名	ホリゾン錠 2mg	ホリゾン錠 5mg	ホリゾン散 1%
一回量	ジアゼパムとして 2～5mg		
飲む回数	1日 2～4回		
外来での 1日の最大使用量	ジアゼパムとして 15mg まで		

#### [不安・緊張・抑うつ（小児）の場合]

販売名	ホリゾン錠 2mg	ホリゾン錠 5mg	ホリゾン散 1%
1 日 量	3歳以下	ジアゼパムとして 1～5mg	
	4～12歳	ジアゼパムとして 2～10mg	
飲む回数	1日 1～3回に分けて飲む		

#### [筋痙攣（成人）の場合]

販売名	ホリゾン錠 2mg	ホリゾン錠 5mg	ホリゾン散 1%
一回量	ジアゼパムとして 2～10mg		
飲む回数	1日 3～4回		

### [麻酔前投薬（成人）の場合]

販売名	ホリゾン錠 2mg	ホリゾン錠 5mg	ホリゾン散 1%
一回量	ジアゼパムとして 5～10mg		
飲む回数	1日1回		

・就寝前または手術前に飲むよう医師が指示します。

#### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

#### ●飲み忘れた場合の対応

[不安・緊張・抑うつ、筋痙攣に使用する場合]

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

[麻酔前投薬に使用する場合]

決して2回分を一度に飲まないでください。

#### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、使用を中止し、ただちに受診してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、この薬を飲んでいる人は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ・この薬の続けて飲んでいくと、薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ないなど、薬物依存の症状があらわれることがあるので、長期間の使用は避けることとされています。このような症状があらわれたら、医師に連絡してください。また、この薬の量を急激に減らしたり、中止したりすることで、けいれん発作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状があらわれることがあるので、この薬を中止する場合には、徐々に減量されます。この薬の飲む量や飲む期間については医師の指示に従ってください。
- ・アルコール飲料は、この薬に影響しますので控えてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳をしている人はこの薬を飲まないでください。やむを得ず薬を飲んだ場合は、授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？









特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
依存性 いぞんせい	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、手足のふるえ、発汗、幻覚、不眠
刺激興奮 しげきこうふん	口数が多くなる、大声で叫ぶ、周囲に暴力をふるう、器物を破壊する、些細なことで怒る
錯乱 さくらん	注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない
呼吸抑制 こきゅうよくせい	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発汗
頭部	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、幻覚、不眠、口数が多くなる、大声で叫ぶ、周囲に暴力をふるう、器物を破壊する、些細なことで怒る、注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない
胸部	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる
手・足	手足のふるえ

## 【この薬の形は？】

販売名	ホリゾン錠 2mg	ホリゾン錠 5mg
PTP シート		
形状	錠剤   	錠剤   
直径	6.0mm	7.0mm
厚さ	2.4mm	2.5mm
重さ	0.09g	0.12g
色	白色	白色
識別コード	MI510	MI511

販売名	ホリゾン散 1%
形状	散剤 
色	白色

### 【この薬に含まれているのは？】

販売名	ホリゾン錠 2mg	ホリゾン錠 5mg	ホリゾン散 1%
有効成分	ジアゼパム		
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム		乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、軽質無水ケイ酸、トウモロコシデンプン

### 【その他】

#### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

#### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

### 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：丸石製薬株式会社

(<http://www.maruishi-pharm.co.jp/>)

学術情報部

電話：0120-014-561

受付時間：9時～17時（土日祝日、弊社指定休日を除く）