

ハイジール[®] 消毒用液 10%

使用濃度	希釈倍数	全量 1L 調製	
		ハイジール消毒用液 10% 必要量	希釈水
0.01%	1000倍	1 mL	999mL
0.05%	200倍	5 mL	995mL
0.1%	100倍	10mL	990mL
0.2%	50倍	20mL	980mL
0.5%	20倍	50mL	950mL

- 深い創傷に使用する希釈水溶液は、調製後滅菌処理してください。
〔詳細は【使用上の注意】 1. 重要な基本的注意 参照〕

【効能・効果】 【用法・用量】

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩として下記の濃度になるように水で希釈して、次のように使用する。

効能・効果	用法・用量 (本品希釈倍数)
医療機器の消毒	0.05～0.2%溶液 (50～200倍) に10～15分間浸漬する。なお、結核領域において使用する場合は、0.2～0.5%溶液 (20～50倍) を用いる。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	0.05～0.2%溶液 (50～200倍) を布片で塗布・清拭するか、又は噴霧する。なお、結核領域において使用する場合は、0.2～0.5%溶液 (20～50倍) を用いる。
手指・皮膚の消毒	0.05～0.2%溶液 (50～200倍) で約5分間洗った後、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。
手術部位 (手術野) の皮膚の消毒	0.1%溶液 (100倍) で約5分間洗った後、0.2%溶液 (50倍) を塗布する。
手術部位 (手術野) の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	0.01～0.05%溶液 (200～1000倍) を用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (4) 深い創傷に使用する希釈水溶液は、調製後滅菌処理すること。