

# 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」

ISO80369-7準拠品  
(浸潤麻酔)

ISO80369-6対策品  
(硬膜外麻酔、伝達麻酔)





個装箱

# 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%NP

ISO80369-7準拠品  
(浸潤麻酔)



ISO80369-6対策品  
(硬膜外麻酔、伝達麻酔)



シリンジ・ラベル

# 塩酸メピバカイン注シリンジ 1%NP

ISO80369-7準拠品

(浸潤麻酔)

ISO80369-6対策品

(硬膜外麻酔、伝達麻酔)





個装箱

# 塩酸メピバカイン注シリンジ1%NP

ISO80369-7準拠品  
(浸潤麻酔)



ISO80369-6対策品  
(硬膜外麻酔、伝達麻酔)



シリンジ・ラベル

# 塩酸メピバカイン注シリンジ2%NP

ISO80369-7準拠品

(浸潤麻酔)

ISO80369-6対策品

(硬膜外麻酔、伝達麻酔)




個装箱

# 塩酸メピバカイン注シリンジ2%NP

ISO80369-7準拠品  
(浸潤麻酔)



ISO80369-6対策品  
(硬膜外麻酔、伝達麻酔)



シリンジ・ラベル



# 塩酸メピバカイン注

ISO80369-7準拠品  
(浸潤麻酔)

ISO80369-6対策品  
(硬膜外麻酔、伝達麻酔)

局所麻酔 禁静注 10mL

塩酸メピバカイン注射液0.5% (NP)

0.5%

50mg/10mL

日本薬学方メピバカイン塩酸塩注射液

発売 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
製造販売 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩60mgを含有する。  
注意-医師等の処方箋により使用すること  
貯法: 室温保存  
シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

高圧蒸気滅菌済み  
プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

シリンジ: PP ゴム  
台 紙: PE  
成形シート: PP F-1  
ゴム: キャップ

局所麻酔 禁静注 10mL

塩酸メピバカイン注射液0.5% (NP)

0.5%

50mg/10mL

日本薬学方メピバカイン塩酸塩注射液

発売 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
製造販売 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩60mgを含有する。  
注意-医師等の処方箋により使用すること  
貯法: 室温保存  
シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

高圧蒸気滅菌済み  
プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

シリンジ: PP ゴム  
台 紙: PE  
成形シート: PP A-1  
ゴム: キャップ

局所麻酔 禁静注 10mL

塩酸メピバカイン注射液1% (NP)

1%

100mg/10mL

日本薬学方メピバカイン塩酸塩注射液

発売 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
製造販売 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩100mgを含有する。  
注意-医師等の処方箋により使用すること  
貯法: 室温保存  
シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

高圧蒸気滅菌済み  
プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

シリンジ: PP ゴム  
台 紙: PE  
成形シート: PP F-1  
ゴム: キャップ

局所麻酔 禁静注 10mL

塩酸メピバカイン注射液1% (NP)

1%

100mg/10mL

日本薬学方メピバカイン塩酸塩注射液

発売 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
製造販売 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩100mgを含有する。  
注意-医師等の処方箋により使用すること  
貯法: 室温保存  
シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

高圧蒸気滅菌済み  
プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

シリンジ: PP ゴム  
台 紙: PE  
成形シート: PP A-1  
ゴム: キャップ

局所麻酔 禁静注 10mL

塩酸メピバカイン注射液2% (NP)

2%

200mg/10mL

日本薬学方メピバカイン塩酸塩注射液

発売 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
製造販売 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩200mgを含有する。  
注意-医師等の処方箋により使用すること  
貯法: 室温保存  
シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

高圧蒸気滅菌済み  
プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

シリンジ: PP ゴム  
台 紙: PE  
成形シート: PP F-1  
ゴム: キャップ

局所麻酔 禁静注 10mL

塩酸メピバカイン注射液2% (NP)

2%

200mg/10mL

日本薬学方メピバカイン塩酸塩注射液

発売 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
製造販売 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩200mgを含有する。  
注意-医師等の処方箋により使用すること  
貯法: 室温保存  
シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

高圧蒸気滅菌済み  
プリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

シリンジ: PP ゴム  
台 紙: PE  
成形シート: PP A-1  
ゴム: キャップ

蓋材