

## K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

**服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。**

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

ツール : 108820  
201603

## K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

**服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。**

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

ツール : 108820  
201603

## K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

**服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。**

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

ツール : 108820  
201603

## K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10<sup>m</sup>/<sub>v</sub>%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

**服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。**

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

ツール : 108820  
201603