

20mL × 5バイアル

局所麻酔剤

1%

劇 日本薬局方  
リドカイン注射液(1%)

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

200mg/20mL

開封口

20mL × 5バイアル

1% 20mL × 5v

劇 日本薬局方  
リドカイン注射液(1%)

含量	10mg/mL
投与方法	皮下・筋・硬膜外等
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方箋医薬品

販売包装単位用コード

使用期限  
製造番号

1%

1% 20mL × 5v

劇 日本薬局方  
リドカイン注射液(1%)

〔成分〕  
1mL中：塩酸リドカイン  
10mg含有

注意—医師等の処方箋により  
使用すること

効能・効果、用法・用量、  
使用上の注意等につい  
ては、添付文書を御参照  
下さい。

紙箱 キャップ  
金 属：キャップ  
コ ム：ゴム栓  
ガラス瓶

発売元 丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元 十指七医薬品株式会社  
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

局所麻酔剤

1%

劇 日本薬局方  
リドカイン注射液(1%)

皮筋特

劇 日本薬局方  
リドカイン注射液(1%)

1%

局所麻酔剤

20mL × 5バイアル

14000096

C-5

Manufactured and Distributed by  
NAGASE MEDICALS CO., LTD.  
4-323, Senzo, Itami, Hyogo, Japan

Distributed by  
Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd.  
2-4-2, Imazu-naka Tsurumi-ku, Osaka, Japan

注意  
本剤の投与によりショク  
ク様症状があらわれた場  
合は、直ちに人工呼吸、  
酸素吸入等を行うこと  
その他の注意事項は添付  
文書を御参照下さい。

J.P  
LIDOCAINE INJECTION  
(1%)

LOCAL ANESTHETIC

1%

200mg/20mL

20mL × 5v



486035

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

74  
74  
74  
74  
74