

哺乳びん・
乳首・器具等の
消毒に

おすすめ使用

次亜塩素酸
ナトリウム製剤
ミルクポン

第2類医薬品

1w/v%

3L

⚠ 使用上の注意 (必ず使用前にお読みください。)

1. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
2. 本品は内服しないでください。また、誤って飲み込んだ時は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。
3. 目に入らないよう注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

関係部位	症状
皮膚	手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ

中薬(カウ)

効能・効果	用法・用量	濃度	希釈倍数	全量1L調製	
				ミルクポン(1w/v%)必要量	希釈水
哺乳びん・乳首の殺菌消毒	哺乳びん・乳首を洗った後、本品の80倍液に1時間以上浸す。	0.0125%	80倍	12.5mL	987.5mL
医療器具の消毒、器具・物品などの消毒	本品の20～50倍液に数分間浸すか、清拭する。	0.02～	50倍	20mL	980mL
		0.05%	20倍	50mL	950mL
室内・便所・浴室の消毒	本品の20～50倍液で清拭する。	0.02～	50倍	20mL	980mL
		0.05%	20倍	50mL	950mL
排泄物の消毒	本品の1～10倍液を用いる。	0.1～	10倍	100mL	900mL
		1%	1倍(原液)	1000mL	(希釈しない)

飲めません

開封日 年 月 日

- 本品は飲まないでください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 本品を取扱う時は、ゴム手袋等をご使用ください。
- ミルクポン溶液はスプレー容器や加湿器等に入れて噴霧しないでください。

用法及び用量に関する注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。(排泄物の消毒時以外は、原液での使用をさけてください。また、熱湯での希釈はさけてください。)
- 換気のよい場所で使用してください。
- 哺乳びん等に付着したミルク等の有機物は、消毒前に十分に洗い落としてからミルクポン溶液につけてください。
- 哺乳びん等は、浮かないようにミルクポン溶液に沈めてください。
- 酸性の洗浄・漂白剤、シアヌル酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですので混合しないでください。
- 金属製・木製の容器又は器具・物品(スプーン等)は、変質する場合がありますので、使用しないでください。
- 調製後、ミルクポン溶液が変色した場合、その水での調製をさけてください。

成分及び分量

次亜塩素酸ナトリウム1w/v%
及び添加物としてpH調整剤 含有。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 衣類、金属製の指輪等につくと脱色、変色することがありますので、注意してください。
- 本品は殺菌消毒する対象物によっては印刷面、材質等を変色(変質)させる場合がありますので注意してください。

【お問合せ先】丸石製薬株式会社 学術情報部
大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL.0120-014-561

製造番号

使用期限

製造販売元

提携

丸石製薬株式会社 ピジョン株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

「ミルクポン」はピジョン(株)の登録商標(日本国内)です。A-1



まぜるな危険

酸性の洗浄・漂白剤、シアヌル酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険です。おやめください。



キャップ:PPE
ボトル:PPE