

# メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」 を使用される方へ

監修：渡部 一宏 先生（昭和薬科大学 臨床薬学研究センター 実践薬学部門 教授）

## メトロニダゾールゲルのはたらき

患部が細菌に感染して膿んでしまっているため、抗菌作用のあるメトロニダゾールゲルで治療をおこないます。細菌を壊したり、増殖を抑えることで、患部の臭気を軽減します。

次の方は、この薬を使用することはできません。

- 過去にこの薬に含まれる成分でアレルギーを経験したことがある方
- 脳や脊髄に器質的な疾患のある方（脳・脊髄のがんは除く）
- 妊娠3ヵ月以内の方

### 【授乳中の方へ】

授乳されている方は使用しないでください。

やむを得ずこの薬を使用される場合は、授乳しないでください。

## 薬の使い方

### 皮膚潰瘍部位の洗浄は毎日してください。

流水と泡立てた弱酸性せっけんで丁寧に・やさしく全体を洗浄し、  
分泌液や壊死組織等を除去しましょう。

※ 洗浄時に痛みがある場合は、生理食塩水を使用してください。

① 1日1～2回ご使用ください。

② 処置前に手を洗います。決められた量の薬をガーゼ等に置き、  
薬をのばすためのへらもしくは棒\* 等で患部と同じ大きさ  
になるようにのばします。 \* 料理用 木製スティック 等

※ 薬の適正量は医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※ 薬はガーゼ等の端まで塗らないようにしてください。

③ 薬を塗ったガーゼ等を患部に貼り、テープで固定します。

※ 薬を塗ったガーゼを患部へ「置くイメージ」で  
強く擦りこまないでください。（出血などの原因になります）

※ 皮膚のかぶれを防ぐために、同じ部位にテープを固定しないように工夫してください。

※ 浸出液対策としてはガーゼ等の上から吸収性の高いパッドで被覆してください。

※ 浸出液が多い場合は、パッドだけをこまめに交換してください。



### 参考情報

#### ■ 浸出液対策のパッド（代替品含む）

- ・ 専用のパッド
- ・ 母乳パッド
- ・ 尿取りパッド
- ・ 生理用ナプキン
- ・ 紙おむつ 等

#### ■ テープ以外の固定方法

- ・ カットイングチューブ



患部に②を置く



テープで固定



パッドで被覆



4辺をテープで固定