

20mL × 5バイアル

局所麻酔剤

1%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)



開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

1%

1% 20mL × 5v

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン
10mg含有
注意—医師等の処方箋により
使用すること

効能・効果、用法・用量、
使用上の注意等につい
ては、添付文書を御参照
下さい。

紙箱 キャップ

金属：キャップ
ゴム：ゴム栓
ガラス：瓶

200mg/20mL

局所麻酔剤

1%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

20mL × 5バイアル

皮筋特

1% 20mL × 5v

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

含量	10mg/mL
投与法	皮下・筋・硬膜外等
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方箋医薬品
使用期限	
製造番号	

※GS1コードは天面に表示
しております。

発売元 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元 十が七医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

1%

皮筋特 局所麻酔剤 20mL

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン10mg含有
注意－医師等の処方箋により使用すること

1%

200mg/20mL

貯法	室温保存
使用期限	
製造番号	

B-4

1%

発売元


Ⓢ **丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

Ⓢ **士丹七医薬品株式会社**
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

(01)04987211850302



20mL×5バイアル

局所麻酔剤

JAN



4 987211 750305

GS1-RSS



(01)14987211750302

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

1%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

200mg/20mL

20mL×5バイアル

1% 20mL×5v

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

局所麻酔剤

1%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

皮筋特

含量	10mg/mL
投与法	皮下・筋・硬膜外等
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方せん医薬品

使用期限	
製造番号	

※JAN、GS1コードは天面に表示しております。

1%

1% 20mL×5v

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン
10mg含有
注意—医師等の処方せんにより
使用すること

効能・効果、用法・用量、
使用上の注意等につい
ては、添付文書を御参照
下さい。

紙箱 キャップ
金属：キャップ
ゴム：ゴム栓
ガラス：瓶

発売元 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元 十光七医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

1%

皮筋特 局所麻酔剤 20mL

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(1%)

1%

200mg/20mL

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン10mg含有
注意－医師等の処方せんにより
使用すること

室温保存

貯法
使用期限
製造番号

B-3

1%

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

才翁堂医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地



(01)04987211850302

GS1-RSS

4 9872111750305
日本薬局方 リドカイン注射液(1%)
20mL×5VのJANコード