10mL×10シリンジ

局所麻酔剤

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SYRINGE

100mg/10mL



1%

高圧蒸気滅菌済み

ブリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

紙

開封済

10mL×10シリンジ

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

100mg/10mL



高圧蒸気滅菌済み

ブリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

1シリンジ（10mL）中、メピバカイン塩酸塩100mgを含有する。
注意－医師等の処方箋により使用すること
貯法：室温保存
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

1%

発売
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
NIPRO
製造販売　ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

10mL×10シリンジ **1%**

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

含　量	100mg
包　装	10mL×10シリンジ
貯　法	室温保存
規制区分	劇　要処方
製造番号	[redacted]
使用期限	[redacted]

[redacted]
販売包装単位コード表示欄

10mL×10シリンジ

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SYRINGE

【取扱い上の注意】

1. ブリスター包装は使用直前まで開封しないこと。使用に際しては、開封口からゆっくり開けること。
2. シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。
3. ブリスター包装から取り出す際、プランジャーを持って引き出さないこと。［ガスケットが変形し、プランジャーが外れたり、薬液が漏出するおそれがある。］
4. 薬液が漏れている場合や、薬液に混濁や浮遊物等の異常が認められるときは使用しないこと。
5. シリンジに破損等の異常が認められるときは使用しないこと。
6. シリンジ先端のキャップを外した後、シリンジ先端部に触れないこと。
7. 開封後の使用は一回限りとし、使用後の残液は容器とともに速やかに廃棄すること。
8. シリンジの再滅菌・再使用はしないこと。
9. 注射針等を接続する場合は誤刺に注意し、しっかりと固定すること。

1%

注　意

本剤の投与により万一ショック様症状が起こった場合は、ただちに人工呼吸、酸素吸入等を実施すること。

10mL×10シリンジ

局所麻酔剤

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SYRINGE

100mg/10mL



高圧蒸気滅菌済み

ブリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

1%

開封済

10mL×10シリンジ

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

100mg/10mL



高圧蒸気滅菌済み

ブリスター包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

1シリンジ（10mL）中、メピバカイン塩酸塩100mgを含有する。
注意－医師等の処方せんにより使用すること
貯法：室温保存
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

1%

発売
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
NIPRO
製造販売　ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

10mL×10シリンジ **1%**

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

含　量	100mg
包　装	10mL×10シリンジ
貯　法	室温保存
規制区分	劇　要処方
製造番号	
使用期限	

JAN 4 987211 114237

GS1 (01)14987211114234

10mL×10シリンジ

劇 **塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」**

MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SYRINGE

【取扱い上の注意】

1. ブリスター包装は使用直前まで開封しないこと。使用に際しては、開封口からゆっくり開けること。
2. シリンジが破損するおそれがあるため、強い衝撃を避けること。
3. ブリスター包装から取り出す際、プランジャーを持って引き出さないこと。[ガスケットが変形し、プランジャーが外れたり、薬液が漏出するおそれがある。]
4. 薬液が漏れている場合や、薬液に混濁や浮遊物等の異常が認められるときは使用しないこと。
5. シリンジに破損等の異常が認められるときは使用しないこと。
6. シリンジ先端のキャップを外した後、シリンジ先端部に触れないこと。
7. 開封後の使用は一回限りとし、使用後の残液は容器とともに速やかに廃棄すること。
8. シリンジの再滅菌・再使用はしないこと。
9. 注射針等を接続する場合は誤刺に注意し、しっかりと固定すること。

1%

注　意

本剤の投与により万一ショック様症状が起こった場合は、ただちに人工呼吸、酸素吸入等を実施すること。

1%

1%

局所麻酔　禁静注　100mg/10mL

劇 塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」

1シリンジ(10mL)中、メピバカイン塩酸塩100mg含有
注意ー医師等の処方箋により使用すること
貯法：室温保存

10mL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1%

1%

局所麻酔　禁静注　100mg/10mL

劇 塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」

発　　売 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

E-1

(01)04987211214234

製造番号

使用期限

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10