

500g

眼科用剤

ホウ酸原末「マルイシ」

Boric Acid [Maruishi]

日本薬局方
ホウ酸

製造販売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

ホウ酸原末「マルイシ」

製造番号

使用期限



＜ 個別包装単位用コード ＞

 (01)204987211254124

＜ 販売包装単位用コード ＞

 (01)14987211154124

500g

眼科用剤

ホウ酸原末「マルイシ」

Boric Acid [Maruishi]

日本薬局方
ホウ酸

製造販売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

開封口

500g

ホウ酸原末「マルイシ」

| | |
|-----------------|---------------|
| 2014年12月改訂(第2版) | |
| 日本標準商品分類番号 | 871319 |
| 承認番号 | 22000AMX02205 |
| 薬価収載 | 2008年12月 |
| 販売開始 | 2008年12月 |
| 再評価結果 | 1985年7月 |

貯 法：室温保存
 使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

- 組成
本品1g中 日局ホウ酸1g 含有。
- 性状
無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。温湯、熱エタノール(95)又はグリセリンに溶けやすく、水又はエタノール(95)にやや溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは3.5～4.1である。

●効能・効果

結膜囊の洗浄・消毒

●用法・用量

2%以下の濃度で用いる。

●使用上の注意

- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

| 頻度不明 | |
|------|---------|
| 過敏症 | 発疹、眼瞼炎等 |

このような症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。

2.適用上の注意

投与経路：眼科用にとのみ使用すること。
 使用時：長期間にわたり使用しないこと。

500g

眼科用剤

ホウ酸原末「マルイシ」

Boric Acid [Maruishi]

日本薬局方
ホウ酸

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

ホウ酸原末「マルイシ」

製造番号

使用期限

紙箱

袋:PE

JAN

GS1-RSS



4



(01)14987211154124

500g

眼科用剤

ホウ酸原末「マルイシ」

Boric Acid [Maruishi]

日本薬局方
ホウ酸

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

ホウ酸原末「マルイシ」

| | |
|----------------|---------------|
| 2009年5月作成(第1版) | |
| 日本標準商品分類番号 | 871319 |
| 承認番号 | 22000AMX02205 |
| 薬価収載 | 2008年12月 |
| 販売開始 | 2008年12月 |
| 再評価結果 | 1985年7月 |

貯法: 室温保存
使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

- 組成
本品1g中 日局ホウ酸1g 含有。
- 性状
無色または白色の結晶で、においはなく、わずかに特異な味がある。
温湯、熱エタノール(95)またはグリセリンに溶けやすく、水またはエタノール(95)にやや溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。
本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは3.5~4.1である。

●効能・効果

結膜囊の洗浄・消毒

●用法・用量

2%以下の濃度で用いる。

●使用上の注意

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

| 頻度不明 | |
|------|---------|
| 過敏症 | 発疹、眼瞼炎等 |

このような症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。

2. 適用上の注意

投与経路: 眼科用にのみ使用すること。
使用時: 長期間にわたり使用しないこと。

ホウ酸原末「マルイシ」

500g



(01)04987211254124



PE

Ⓢ 丸石製薬株式会社