

1% 50mL

全身麻酔・鎮静用剤

1% 50mL

劇 1%プロポフォル注  
「マルイシ」

全身麻酔・鎮静用剤

50mL×1バイアル

50mL×1Vial

Powerful  
1% Propofol inj.  
“Maruishi”

1% 50mL

資材変更品

禁・凍結

紙 : 箱

キャップ: PE

金属: キャップ  
ゴム: ゴム栓  
ガラス: 瓶

A-1

金属キャップは取らなからず

50mL×1バイアル

劇 1%プロポフォル注  
「マルイシ」

1% 50mL

製造番号

使用期限



(01)14987211710115

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等  
詳細は添付文書をご参照願います。

OPEN

劇 1%プロポフォル注  
「マルイシ」

【組成】 1バイアル 50mL中  
プロポフォル500mg含有

【貯法】 凍結を避けて室温保存

禁・凍結

資材変更品

製造販売(輸入)元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携: B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

シムシムな  
恐れがある

50mL×1バイアル

劇 1%プロポフォル注  
「マルイシ」

1% 50mL

【貯法】 凍結を避けて室温保存  
禁・凍結

注意-習慣性あり  
注意-医師等の処方箋により使用すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみの使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

1% 50mL

全身麻酔・鎮静剤 劇

▶ OPEN

1% 50mL

1%プロポフォール注 「マルイシ」

全身麻酔・鎮静剤 劇

50mL×1バイアル

50mL×1 Vial

Powerful  
1% Propofol inj.  
"Maruishi"

1% 50mL



禁・凍結

紙 : 箱

キャップ: PE

金属: キャップ  
ゴム: ゴム栓  
ガラス: 瓶

50mL×1バイアル

劇  
1%プロポフォール注  
「マルイシ」

1% 50mL

【貯法】 凍結を避けて25℃以下保存

製造番号

使用期限

GS1-RSS



JAN



50mL×1バイアル

劇  
1%プロポフォール注  
「マルイシ」

1% 50mL

注意-習慣性あり  
注意-医師等の処方せんにより使用すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみ使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等  
詳細は添付文書をご参照願います。

劇  
1%プロポフォール注  
「マルイシ」

【組成】 1バイアル 50mL中  
プロポフォール500mg含有

【貯法】 凍結を避けて25℃以下保存



禁・凍結

製造販売(輸入)元

丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携: B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

使用期限

製造番号

静

全身麻酔・鎮静用剤

劇 1%プロポフォール注「マルイシ」

工場用コード

500mg/50mL

【組成】 1バイアル 50mL中 プロポフォール500mg含有

【貯法】 凍結を避けて25℃以下保存 注意—習慣性あり 注意—医師等の処方せんにより使用すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみでの使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

50mL

製造販売(輸入)元



丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携：B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

597/12299562/0708

全身麻酔・鎮静用剤

1%プロポフォール注  
「マルイシ」



(01)04987211810115

使用期限

製造番号

静

全身麻酔・鎮静用剤

劇 1%プロポフォール注「マルイシ」

工場用コード

500mg/50mL

[組成] 1バイアル 50mL中 プロポフォール500mg含有

[貯法] 凍結を避けて室温保存 注意—習慣性あり 注意—医師等の処方箋により使用すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみでの使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

50mL


製造販売(輸入)元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携：B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

597/12299562/0115



(01)04987211810115

全身麻酔・鎮静用剤  
1%プロポフォール注  
「マルイシ」