

使用期限
製造番号

【静】
全身麻酔・鎮静用剤

劇 1%プロポフォール注「マルイシ」

工場用コード

1000mg/100mL

【組成】

1バイアル 100mL中
プロポフォール1000mg含有

【貯法】凍結を避けて室温保存

注意—習慣性あり

注意—医師等の処方箋により使用
すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみでの使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

製造販売(輸入)元

100mL

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携：B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

597/12299563/0115



(01)04987211810122

全身麻酔・鎮静用剤
1%プロポフォール注「マルイシ」

全身麻酔・鎮静用剤

1% 100mL

「マルイシ」
1%プロポフォール注

全身麻酔・鎮静用剤

100mL×1バイアル

100mL×1Vial

Powerful
1% Propofol inj.
"Maruishi"

1% 100mL

資材変更品

禁・凍結

紙：箱

キャップ：PE

金属：キャップ
ゴム：ゴム栓
ガラス：瓶

全身麻酔・鎮静用剤
1%プロポフォール注

100mL×1バイアル

劇
1%プロポフォール注
「マルイシ」

1% 100mL

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製造番号

使用期限

(01)14987211710122

OPEN

1% 100mL

劇
1%プロポフォール注
「マルイシ」

資材変更品

【組成】 1バイアル 100mL中
プロポフォール1000mg含有

【貯法】 凍結を避けて室温保存

禁・凍結

製造販売(輸入)元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携：B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

全身麻酔・鎮静用剤
1%プロポフォール注

100mL×1バイアル

劇
1%プロポフォール注
「マルイシ」

1% 100mL

【貯法】 凍結を避けて室温保存

禁・凍結

注意－習慣性あり

注意－医師等の処方箋により使用すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみ使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

使用期限
製造番号

【静】
全身麻酔・鎮静用剤

劇 1%プロポフォール注「マルイシ」

工場用コード

1000mg/100mL

【組成】

1バイアル 100mL中
プロポフォール1000mg含有

【貯法】 凍結を避けて25℃以下保存

注意—習慣性あり

注意—医師等の処方せんにより使用
すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみでの使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

100mL



製造販売(輸入)元
丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携：B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

597/12299563/0708

全身麻酔・鎮静用剤

1%プロポフォール注「マルイシ」



(01)04987211810122

全身麻酔・鎮静剤用

OPEN ▶

1% 100mL

「マルイシ」

1%プロポフォール注

全身麻酔・鎮静剤用

100mL×1バイアル

100mL×1Vial

Powerful

1% Propofol inj.
"Maruishi"

1% 100mL



禁・凍結

紙：箱

キャップ：PE

金属：キャップ

ゴム：ゴム栓

ガラス：瓶

100mL×1バイアル

劇
1%プロポフォール注
「マルイシ」

1% 100mL

【貯法】凍結を避けて25℃以下保存

製造番号

使用期限

GSI-RSS



JAN



1% 100mL

劇
1%プロポフォール注
「マルイシ」

【組成】1バイアル 100mL中
プロポフォール1000mg含有

【貯法】凍結を避けて25℃以下保存



禁・凍結

製造販売(輸入)元

丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携：B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

100mL×1バイアル

劇
1%プロポフォール注
「マルイシ」

1% 100mL

注意—習慣性あり
注意—医師等の処方せんにより使用すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみ使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。