500g

カリ石ケン「ニッコー」

Potash Soap [NIKKO]

日本薬局方 カリ石ケン

発売元

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元 岐阜県羽島市江吉良町1593

カリ石ケン「ニッコー」

500g

2015年3月改訂(第3版)		
日本標準商品分類番号	872662	
承認番号	16100AMZ00997	
薬価収載	1955年9月	
販売開始	1993年9月	

法: 室温保存 使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

組成・性状

1.組成

本品1g中 日局カリ石ケン1g 含有。

2.性状 黄褐色透明粘滑の軟塊で、特異なにおいがある。

水又はエタノール(95)に溶けやすい。 ●効能・効果●用法・用量

浣腸液、洗浄液の調剤に用いる。 ●使用上の注意

1.副作用

となる調査を実力	よる調査を実施していない。	
	頻度不明	
過敏症注1)	発赤、刺激	
内 (株注2)	:即(本盤)	

症状を悪化させることがあるので、このような場合には使用を 中止し、適切な処間をとること。

2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 妊娠中の婦人に浣腸液として使用する 場合は慎重に使用すること。

(副作用があらわれやすい) 3.適用上の注意

投与部位: 眼又は眼のまわりには使用 しないこと。



製造番号


使用期限

(01)049872112185

500g

カリ石ケン「ニッコー」

500g



法:室温保存

使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

- ●組成・性状
 - 1 組成 本品lg中 日局カリ石ケンlg 含有。
- 2.性状 黄褐色透明粘滑の軟塊で特異なにおいがある。 水又はエタノール(95)に溶けやすい。
- ●効能・効果●用法・用量 浣腸液、洗浄液の調剤に用いる。
- *●使用上の注意
 - 1.副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確 となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症注1)	発赤、刺激
皮 膚注2)	湿疹等
No. 3.3 Trans. In 20 documents to 4	/まぐかれた何心には使用をかりまえて!

注2)症状を悪化させることがあるので、このような場合には使用を 中止し、適切な処置をとること。

2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 妊娠中の婦人に浣腸液として使用する 場合は慎重に使用すること。

「副作用があらわれやすい〕 3. 適用上の注意 投与部位: 眼叉は眼のまわりには使用 しないこと。

製造番号

使用期限

発売元

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日本薬局方

カリ石ケン「ニッコー」

Potash Soap [NIKKO]

カリ石ケン

岐阜県羽島市江吉良町1593

