

注意

- (1) 人体に使用しないこと。
- (2) 本剤の成分又はアルデヒドに対し過敏症の既往歴のある者は、本剤を取り扱わないこと。
- (3) 本剤は必ず換気状態のよいところで、ゴーグル、防水エプロン、マスク、ゴム手袋等の保護具を装着して使用し、吸入、吸引、接触しないように注意すること。
万一、接触したときは直ちに多量の水で洗い流し、特に眼に入った場合などは、専門医の処置を受けること。
- (4) 浸漬用容器にはふたをすること。
- (5) 器具に付着した体液等を除去するための予備洗浄を十分に行ってから使用すること。
- (6) 消毒終了後は多量の水で本剤を十分に洗い流すこと。
- (7) 環境殺菌目的に使用(汚染部分の清拭・噴霧等)しないこと。
- (8) 調製後(緩衝化剤添加後)の液は直ちに使用すること。

貯法：遮光した気密容器
に入れ、30℃以下
で保存。



キャップ:PP
ボトル:PE

<調剤包装単位用コード>



(01)04987211630034

<販売包装単位用コード>



(01)14987211530034

グルタール製剤
化学的滅菌・殺菌消毒剤
(医療用器具・機器・装置専用)

劇 STERIHYDE[®]L
ステリハイド[®]L2^{w/v}%液

2^{w/v}%

有効成分

グルタール(グルタルアルデヒド) 2% (緩衝化剤 30mL 添付)

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造番号

使用期限

1L

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

グルタール製剤 化学的滅菌・殺菌消毒剤 (医療用器具・機器・装置専用)

注意

- (1)人体に使用しないこと。
- (2)本剤の成分又はアルデヒドに対し過敏症の既往歴のある者は、本剤を取り扱わないこと。
- (3)本剤は必ず換気状態のよいところで、ゴーグル、防水エプロン、マスク、ゴム手袋等の保護具を装着して使用し、吸入、吸引、接触しないように注意すること。万一、接触したときは直ちに多量の水で洗い流し、特に眼に入った場合は、専門医の処置を受けること。
- (4)浸漬用容器にはふたをすること。
- (5)器具に付着した体液等を除去するための予備洗浄を十分に行ってから使用すること。
- (6)消毒終了後は多量の水で本剤を十分に洗い流すこと。
- (7)環境殺菌目的に使用（汚染部分の清拭・噴霧等）しないこと。
- (8)調製後（緩衝化剤添加後）の液は直ちに使用すること。

貯法：遮光した気密容器に入れ、
30℃以下で保存。



キャップ：PP
ボトル：PE

GS1-RSS



(01)14987211530034

JAN



4 987211 530037

劇 STERIHYDE[®]L
ステリハイド[®]L2^W%液

2^W%

有効成分

グルタール(グルタルアルデヒド) 2^W%
(緩衝化剤 30mL 添付)

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造番号

使用期限

1L

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2