

25kg



2015年4月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	22000AMX02203
薬価収載	2008年12月
販売開始	2008年12月
再評価結果	1979年2月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

## ●禁忌(次の部位には使用しないこと)

- (1)重傷又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]  
 (2)患部が湿潤している場所[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

## ●組成・性状

## 1.組成

本品1g中 日局酸化亜鉛1g 含有。

## 2.性状

白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。  
 水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。  
 希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。  
 空气中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

## ●効能・効果

軽度の皮膚病変の取れん・消炎・保護・緩和な防腐

## ●用法・用量

- 外用散剤(散布剤)として15~100%  
 ○軟膏剤・液剤(懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等)として2~60%  
 上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1~数回患部に適用する。

## ●使用上の注意

## 1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

## 2.適用上の注意

使用部位：眼には使用しないこと。  
 使用時：誤って吸入しないよう注意させること。

△↑↑↑単位包装標準規格



△↑↑↑単位包装標準規格



収斂・消炎・保護剤

# 酸化亜鉛原末「マルイシ」

## Zinc Oxide「Maruishi」

日本薬局方

酸化亜鉛

製造販売元

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造番号

使用期限

25kg

2009年8月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	22000AMX02203
業倫記載	2008年12月
販売開始	2008年12月
再評価結果	1979年2月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)



収斂・消炎・保護剤

# 酸化亜鉛原末「マルイシ」

## Zinc Oxide「Maruishi」

日本薬局方

酸化亜鉛

## ●禁忌(次の部位には使用しないこと)

- (1)重度または広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕  
 (2)患部が湿潤している場所〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕

## ●組成・性状

## 1.組成

本品 1g中 日局酸化亜鉛 1g 含有。

## 2.性状

白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。  
 水、エタノール(95)、酢酸(100)またはジエチルエーテルにほとんど溶けない。  
 希塩酸または水酸化ナトリウム試液に溶ける。  
 空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

## ●効能・効果

軽度の皮膚病変の取れん・消炎・保護・緩和な防腐

## ●用法・用量

- 外用散剤(散布剤)として15~100%  
 ○軟膏剤・液剤(懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等)として2~60%  
 上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1~数回患部に適用する。

## ●使用上の注意

## 1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

## 2.適用上の注意

使用部位：眼には使用しないこと。  
 使用時：誤って吸入しないよう注意させること。

GS1-RSS



JAN



製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造番号

使用期限

酸化亜鉛原末「マルイシ」

25kg



(01)04987211227180



Ⓜ 丸石製薬株式会社