2000mg/100mL

LOCAL ANESTHETIC

J.P
LIDOCAINE INJECTION
(2%)

2%

Distributed by
Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd.
2-4-2, Imazu-naka Tsurumi-ku, Osaka, Japan
Manufactured and Distributed by
NAGASE MEDICALS CO., LTD.
4-323, Senzo, Itami, Hyogo, Japan

100mL
局所麻酔剤

注意
本剤の投与によりショック様症状があらわれた場合は、直ちに人工呼吸、酸素吸入等を行うこと。その他の注意事項は添付文書を御参照下さい。

2% 100mL

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

含量	20mg／mL
投与法	皮下・筋・硬膜外等
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方箋医薬品
使用期限	
製造番号	

(01)14987211750517

2%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

2%

2000mg/100mL
局所麻酔剤

劇
日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

皮 筋 特

2%

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

2%

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

2% 100mL

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン20mg含有

注意—医師等の処方箋により使用すること
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、添付文書を御参照下さい。

2%

紙 箱　プラ キャップ
金　属：キャップ
ゴ　ム：ゴム栓
ガラス：瓶

B-4　JEG000SA

2%

2000mg/100mL

LOCAL ANESTHETIC

J.P
LIDOCAINE INJECTION
(2%)

2%

Distributed by
Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd.
2-4-2, Imazu-naka Tsurumi-ku, Osaka, Japan
Manufactured and Distributed by
NAGASE MEDICALS CO., LTD.
4-323, Senzo, Itami, Hyogo, Japan

100mL
局所麻酔剤

注意

本剤の投与によりショック様症状があらわれた場合は、直ちに人工呼吸、酸素吸入等を行うこと。その他の注意事項は添付文書を御参照下さい。

2%　100mL

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

含量	20mg／mL
投与法	皮下・筋・硬膜外等
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方せん医薬品
使用期限	
製造番号	

GS1-RSS
(01)14987211750517
JAN
4 987211 750510

2%

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

2%

2000mg/100mL
局所麻酔剤

劇
日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

皮 筋 特

2%

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

B-3

JEG000SA

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

2%　100mL

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン20mg含有

注意一医師等の処方せんにより使用すること
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、添付文書を御参照下さい。

2%

紙箱　プラキャップ
金　属：キャップ
ゴ　ム：ゴム栓
ガラス：瓶

2%

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

2%

皮 筋 特　局所麻酔剤　100mL

2%

劇

日本薬局方

リドカイン注射液(2%)

2%

(01)04987211850517

2000mg/100mL

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン20mg含有

注意ー医師等の処方箋により使用すること

発売元

㊟ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

ナガセ医薬品株式会社

兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

A-5

2%

貯法	室温保存
使用期限	
製造番号	

4 987211 750510
日本薬局方 リドカイン注射液(2%)
100mL×1VのJANコード

皮 筋 特 局所麻酔剤 100mL

2%

劇
日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

2%

(01)04987211850517
GS1-RSS

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン20mg含有
注意一医師等の処方せんにより使用すること

2000mg/100mL

2%

貯法	室温保存
使用期限	
製造番号	

A-4

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地