

レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

25mg/10mL(0.25%)

劇 ポプスカイン® 0.25%注 25mg/10mL

POPSCAINE® 0.25% inj. 25mg/10mL

10mL×10アンプル

注意一医師等の処方箋により使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩2.82mg
(レボブピバカインとして2.5mg)含有

【効能・効果】術後鎮痛、伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

製造番号

使用期限



レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

25mg/10mL(0.25%)

劇 ポプスカイン® 0.25%注 25mg/10mL

POPSCAINE® 0.25% inj. 25mg/10mL

10mL×10アンプル

注意一医師等の処方箋により使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩2.82mg
(レボブピバカインとして2.5mg)含有

【効能・効果】術後鎮痛、伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

25mg/10mL(0.25%)

劇 ポプスカイン® 0.25%注
25mg/10mL

10mL×10アンプル

禁 静 注

レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

25mg/10mL(0.25%)

劇 ポプスカイン® 0.25%注 25mg/10mL

POPSCAINE® 0.25% inj. 25mg/10mL

10mL×10アンプル

注意—医師等の処方せんにより使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩2.82mg
(レボブピバカインとして2.5mg)含有

【効能・効果】術後鎮痛、伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

製造番号

使用期限

GS1-RSS



(01)14987211752214



JAN



4 987211 752217

レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

25mg/10mL(0.25%)

劇 ポプスカイン® 0.25%注 25mg/10mL

POPSCAINE® 0.25% inj. 25mg/10mL

10mL×10アンプル

注意—医師等の処方せんにより使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩2.82mg
(レボブピバカインとして2.5mg)含有

【効能・効果】術後鎮痛、伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

25mg/10mL(0.25%)

**劇 ポプスカイン® 0.25%注
25mg/10mL**

禁 静 注

10mL×10アンプル

25mg/10mL

禁 静 注

劇ポブスカイン0.25%注
25mg/10mL

【組成】 1管(10mL)中

レボブピバカイン塩酸塩28.2mg

(レボブピバカインとして25mg)含有

【効能・効果】 術後鎮痛、伝達麻酔

【貯法】 室温保存

B

注意－医師等の処方箋
により使用すること

0.25%

Ⓢ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造番号

使用期限

ポプスカイン0.25%注
25mg/10mL



(01)04987211852214

禁 静 注



A