

# オキシドール 消毒用液「マルイシ」

500mL  
オキシドール消毒用液「マルイシ」

ヘラーコ<sup>®</sup>  
販売包装単位用コード  
<調査>

ヘラーコ<sup>®</sup>  
販売包装単位用コード  
<販売包装単位用コード>

キャップ：PP  
ボトル：PE  
ラベル：PET



使用後、フィルムをはがして  
キャップをはずした後、空容器  
を図のよろしくて折り目を外側  
に押しつぶして下さい。  
(つぶした後は元に戻りません。)

MARUISHI

開封日 年 月 日

500mL

外用殺菌消毒剤

# オキシドール 消毒用液「マルイシ」

Oxydol Disinfectant Solution 「Maruishi」

日本薬局方  
オキシドール

製造番号

使用期限

製造販売元  
**丸石製薬株式会社**  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

# オキシドール 消毒用液「マルイシ」

500mL  
オキシドール消毒用液「マルイシ」

2014年11月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872614
承認番号	21900AMX01461
販売戻戻	2007年12月
販売開始	2007年12月
再評価結果	1983年4月

貯法：遮光し、30℃以下で保存。

使用期限：3年6ヶ月(表示の使用期限を参照すること。)

注意：〈配合禁忌〉酸化剤、還元剤、アルカリ性により分解する。

#### ●禁忌(次の部位には使用しないこと)

癰孔、挫創等本剤を使用した際に体腔にしみ込むおそれのある部位  
[空気塞栓を起こしたとの報告がある。]

#### ●組成・性状

1.組成  
過酸化水素 3.0% v/v  
及び添加物として冰酢酸、アセトアニド、エデト酸ナトリウム水和物、エタノール 含有。

#### 2.性状

無色透明の液で、においはないか、又はオゾンようのにおいがある。  
本品は光によって変化する。  
pH: 3.0~5.0、比重  $\rho_{20}^{\circ}$ : 約1.01

#### ●効能・効果 ●用法・用量

効能・効果	用法・用量
創傷・潰瘍の殺菌・消毒	原液のままあるいは2~3倍希釈して洗浄する。
外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症	原液のまま塗布・滴下あるいは10倍(耳科の場合、時にクリゼン、アルコールで希釈する)希釈して洗浄、噴霧、含嗽に用いる。
口腔粘膜の消毒、齶窩及び根管の清掃・消毒、歯の清浄 口内炎の洗口	原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃する。 10倍に希釈して洗口する。

#### ●使用上の注意

##### 1.重要な基本的注意

長期間又は広範囲に使用しないこと。

##### 2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### (1)重大な副作用

空気塞栓(頻度不明)：  
空気塞栓を起こすことがあるので、循環動態に異常を認めた場合など空気塞栓が疑われる症状がみられた場合は、速やかに本剤の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

##### (2)その他の副作用

口腔(頻度不明)：  
連用により口腔粘膜を刺激することがある。

##### 3.適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用し、内服しないこと。  
使用時：

(1)眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

(2)易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用する場合よりも低濃度とすることが望ましい。

(3)深い創傷に使用する場合の希釈液としては注射用蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

##### 4.その他の注意

長期大量経口投与によりマウスの十二指腸に腫瘍の発生が認められたとの報告がある。

# オキシドール 消毒用液「マルイシ」

