

長時間作用性局所麻酔剤
レボピバカイン塩酸塩注射剤
開封口 ←

50mg/10mL (0.5%)

高圧蒸気滅菌済み
プラスチック包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないでください。

長時間作用性局所麻酔剤
レボピバカイン塩酸塩注射剤

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

禁 静 注

レボピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

POPSCAINE 0.5% inj. syringe
50mg/10mL



禁 静 注

注意
本剤の投与により万一ショック様症状が起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素吸入を実施すること。



50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL




禁 静 注

注意—医師等の処方箋により
使用すること

【組成】1シリンジ(10mL)中
レボピバカイン塩酸塩 56.3mg
(レボピバカインとして 50mg)含有
【効能・効果】伝達麻酔
【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。



50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

POPSCAINE 0.5% inj. syringe
50mg/10mL



禁 静 注

10mL×10シリンジ

高圧蒸気滅菌済み
プラスチック包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2



50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL



禁 静 注

包 装	10mL×10シリンジ
規制区分	劇薬・処方箋医薬品
貯 法	室温保存
製造番号	
使用期限	



高圧蒸気滅菌済み
プラスチック包装内は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

作成日	2013.6.26
品名	ポプス0.5
材質	コートボール450g/m ²
会社名	DNP東北

50mg/10mL (0.5%)

高圧蒸気滅菌済み
プラスチック製容器包装
内容物に直接触れないでください

レボピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

禁 静 注

レボピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

POPSCAINE 0.5% inj. syringe
50mg/10mL

禁 静 注

注 意

本剤の投与により万一ショック様症状が起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素吸入を実施すること。

A-3

50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

禁 静 注

注意—医師等の処方せんにより
使用すること

【組成】1シリンジ(10mL)中
レボピバカイン塩酸塩 56.3mg
(レボピバカインとして 50mg)含有
【効能・効果】伝達麻酔
【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

紙 中仕切り線

50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

POPSCAINE 0.5% inj. syringe
50mg/10mL

禁 静 注

10mL×10シリンジ

高圧蒸気滅菌済み
プラスチック製容器包装は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

製造販売元

Ⓟ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

50mg/10mL (0.5%)

劇 ポプスカイン®0.5%注シリンジ
50mg/10mL

禁 静 注

包 装	10mL×10シリンジ
規制区分	劇薬・処方せん医薬品
貯 法	室温保存
製造番号	
使用期限	

JAN



4 987211 752521

GSI



高圧蒸気滅菌済み
プラスチック製容器包装は滅菌済みであるので使用時まで開封しないこと。

開封口▶

50mg/10mL

0.5%

禁 静 注

高圧蒸気滅菌済み

プリスター包装内は滅菌済みである
ので使用時まで開封しないこと。

**劇 ポプスカイン0.5%注シリンジ
50mg/10mL**



シリンジ
成形シート
台紙
ゴム：キャップ

生 薬 類

1C-2

【組成】 1シリンジ(10mL)中レボブピバカイン塩酸塩 56.3mg
(レボブピバカインとして 50mg)含有

【効能・効果】 伝達麻酔

【貯法】 室温保存



(01)04987211852528

注意—医師等の処方箋により使用すること
用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書
をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

口 挿 入 ▶

製造番号

使用期限



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.5
%

劇 **ポプスカイン0.5%注**
シリンジ 50mg/10mL

【効能・効果】 伝達麻酔

【組成】 1シリンジ(10mL)中 レボブピバカイン塩酸塩56.3mg
(レボブピバカインとして50mg) 含有

注意—医師等の処方箋により使用すること

用法・用量等詳細は添付
文書をご参照願います。

【貯法】 室温保存
B-2

禁静注

50mg
/10mL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.5
%

劇 **ポプスカイン0.5%注**
シリンジ 50mg/10mL



(01)04987211852528

製造販売元

Ⓡ **丸石製薬株式会社** 大阪市鶴見区今津中2-4-2