

MARUISHI

鎮痛剤

1mL×10管

劇 ① ソセゴン® 注射液 15mg

差込口

1mL×10管
劇 ① ソセゴン® 注射液 15mg



使用
期限

製造
番号

15mg
15mg/1mL



このター入は、
再生紙を使用
しております。



15mg
15mg/1ml

(ペンタゾシン注射液)

劇 ソセゴン® 注射液 15mg
Sosegon® Injection 15mg

鎮痛剤

箱を廃棄するときは、
両側のミシン目を
押し破ってください。

1mL×10管

SANOFI
提携

① 丸石製薬株式会社
製造販売元
大阪府鶴見区今津中2-4-2

注意一医師等の処方箋により使用すること
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

- 組成 1管(1mL)中
ペンタゾシン15mg含有
- 貯法 室温保存
- 注意一習慣性あり

15mg/1ml
15mg

劇 ソセゴン® 注射液 15mg

1mL×10管

MARUISHI

鎮痛剤

1mL×10管

劇 ① ソセゴン® 注射液 15mg

Sosegon® Injection 15mg

(ペンタゾシン注射液)

本剤の依存性にもとづく
医療外使用の事例が報告
されているので、保管管理
に十分注意すること。

15mg

15mg/1mL

開封口

製造販売元

① 丸石製薬株式会社
大阪府鶴見区今津中2-4-2



鎮痛剤

1mL×10管

劇 ソセゴン® 注射液 15mg

差込口

1mL×10管

劇 ソセゴン® 注射液 15mg

JAN

使用期限

製造番号

15mg
15mg/1mL



GS1-RSS



4 987211 135331



このケースは、再生紙を使用しております。

紙箱
カラス：マツル

15mg
15mg/1mL

(ペンタゾシン注射液)

劇 ソセゴン® 注射液 15mg
Sosegon® Injection 15mg

鎮痛剤

箱を廃棄するときは、両側のミシン目を押し破ってください。

1mL×10管

SANOFI

® 丸石製薬株式会社
製造販売元
大阪府鶴見区今津中2-4-2

● 組成 1管(1mL)中 ペンタゾシン15mg含有
● 貯法 室温保存
● 注意—習慣性あり
注意—医師等の処方せんにより使用すること
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。



15mg
15mg/1mL

劇 ソセゴン® 注射液 15mg

1mL×10管

鎮痛剤

1mL×10管

劇 ソセゴン® 注射液 15mg

Sosegon® Injection 15mg

(ペンタゾシン注射液)

本剤の依存性にもとづく医療外使用の事例が報告されているので、保管管理に十分注意すること。

15mg

15mg/1mL

開封口

製造販売元

® 丸石製薬株式会社
大阪府鶴見区今津中2-4-2



15mg/1mL 筋皮静

劇 向

習慣性、要処方

ソセゴン[®]注射液 15mg

〈貯法〉室温保存
丸石製薬 大阪

使用
期限

製造
番号

A-1

劇 **ソセゴン[®]注射液 15mg**

(01)04987211235338

