2%

2%　20mL×5v

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン
20mg含有
注意―医師等の処方箋により
使用すること

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、添付文書を御参照下さい。

紙 箱　プラ キャップ
金　属:キャップ
ゴ　ム:ゴム栓
ガラス:瓶

20mL×5バイアル

2%

局所麻酔剤

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

400mg/20mL

20mL×5バイアル

局所麻酔剤

2%

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

皮 筋 特

発売元　丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元　ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

(01)14987211750500

2%　20mL×5v

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

含量	20mg／mL
投与法	皮下・筋・硬膜外等
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方箋医薬品
使用期限	
製造番号	

※GS1コードは天面に表示しております。

2%

2%　20mL×5v

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン
20mg含有

注意一医師等の処方せんにより
使用すること

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、添付文書を御参照下さい。

紙箱　キャップ
金　属:キャップ
ゴ　ム:ゴム栓
ガラス:瓶

20mL×5バイアル

2%

局所麻酔剤

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

JAN
4 987211 750503
GS1-RSS
(01)14987211750500

400mg/20mL

20mL×5バイアル

局所麻酔剤

2%

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

皮 筋 特

発売元　丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元　ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

2%　20mL×5v

劇　日本薬局方
リドカイン注射液(2%)

含量	20mg／mL
投与法	皮下・筋・硬膜外等
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方せん医薬品
使用期限	
製造番号	

※JAN、GS1コードは天面に表示しております。

2%

皮 筋 特　局所麻酔剤　20mL

劇　日本薬局方

リドカイン注射液(2%)

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン20mg含有

注意ー医師等の処方箋により使用すること

2%

400mg/20mL

貯法	室温保存
使用期限	
製造番号	

B-4

2%

発売元

㊞ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

ナガセ医薬品株式会社

兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

(01)04987211850500

2%

皮 筋 特　局所麻酔剤　20mL

劇　日本薬局方

リドカイン注射液(2%)

2%

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン20mg含有

400mg/20mL

注意－医師等の処方せんにより使用すること

貯法	室温保存
使用期限	
製造番号	

B-3

2%

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

GS1-RSS

(01)04987211850500

4 987211 750503

日本薬局方　リドカイン注射液(2%)
20mL×5VのJANコード