

500mL

鎮咳去痰剤

劇 **キョウニン水「マルイシ」**
Apricot Kernel Water 「Maruishi」

日本薬局方
劇 **キョウニン水**

製造販売元

 **丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2

劇 **キョウニン水「マルイシ」**

500mL

劇薬

2014年11月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872241
承認番号	16100AMZ01000
薬価収載	1952年2月
販売開始	1952年2月
再評価結果	1981年8月

貯 法：遮光し、室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)
注 意：光線及び熱によって変化しやすい。

● **禁忌**(次の患者には投与しないこと)
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「1.相互作用」の項参照)

● **組成・性状**

- 組成
本品1mL中 日局キョウニン水1mL 含有。
- 性状
無色～微黄色澄明な液で、ベンズアルデヒドのようにおい及び特異な味がある。
pH：3.5～5.0
比重 d_{20}^{20} ：0.968～0.978

● **効能・効果**

急性気管支炎に伴う咳嗽及び喀痰喀出困難

● **用法・用量**

通常成人1日3mLを3～4回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
但し、極量として、1回2mL、1日6mLをこえないものとする。

● **使用上の注意**

- 相互作用
(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム(ノックピン)、シアナミド(シアナマイド)、カルモフル(ミフロール)、プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

- 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質(セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシフナトリウム)、メロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. **副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

大量投与(頻度不明)：悪心・嘔吐、下痢、めまい、頭痛、瞳孔散大、心悸亢進、過呼吸、チアノーゼ、意識喪失、窒息性痙攣等の症状があらわれるおそれがある。

3. **高齢者への投与**

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. **小児等への投与**

小児等への投与を避けること。
[小児等では副作用が発現しやすい]



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PE

＜トリーコード＞
劇薬包単単位用
04987211221911

＜トリーコード＞
販売包単単位用
04987211221911

500mL

鎮咳去痰剤

劇 **キョウニン水「マルイシ」**
Apricot Kernel Water 「Maruishi」

日本薬局方
劇 **キョウニン水**

製造販売元

 **丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2

劇 **キョウニン水「マルイシ」**

劇薬

*2009年7月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872241
承認番号	16100AMZ01000
薬価収載	1952年2月
販売開始	1952年2月
再評価結果	1981年8月

貯法：遮光し、室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)
注意：光線及び熱によって変化しやすい。

* ● **禁忌**(次の患者には投与しないこと)
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「1.相互作用」の項参照)

● **組成・性状**1. **組成**

本品1mL中 日局キョウニン水1mL 含有。

2. **性状**

無色～微黄色澄明の液で、ベンズアルデヒドのようにおい及び特異な味がある。
pH：3.5～5.0
比重 d_{20}^{20} ：0.968～0.978

● **効能・効果**

急性気管支炎に伴う咳嗽及び喀痰喀出困難

● **用法・用量**

通常、成人1日3mLを3～4回に分経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
但し、極量として、1回2mL、1日6mLをこえないものとする。

500mL

* ● **使用上の注意**1. **相互作用**

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム(ノックピン)、シアナミド(シアナミド)、カルモフル(ミプロール)、プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質(塩酸セフメノキシム、セフォペラゾンナトリウム、セフペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシフェナトリウム)、メロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. **副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

大量投与(頻度不明)：悪心・嘔吐、下痢、めまい、頭痛、瞳孔散大、心悸亢進、過呼吸、チアノーゼ、意識喪失、窒息性痙攣等の症状があらわれるおそれがある。

3. **高齢者への投与**

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. **小児等への投与**

小児等への投与を避けること。
[小児等では副作用が発現しやすい。]

 キャップ：PP
 ボトル：PE
 ラベル：PE

GST-FRSS



4