

500g

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「マルイシ」

Zinc Oxide Starch Powder 「Maruishi」

日本薬局方

亜鉛華デンプン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

亜鉛華デンプン「マルイシ」

製造番号

使用期限



500g

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「マルイシ」

Zinc Oxide Starch Powder 「Maruishi」

開封口

日本薬局方

亜鉛華デンプン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

亜鉛華デンプン「マルイシ」 500g

2014年12月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ00988
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1979年2月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意：空気中から二酸化炭素を吸収して変質する。

- 禁忌(次の部位には使用しないこと)
- (1)重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]
 (2)患部が湿潤している場所[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

●組成・性状

- 1.組成
酸化亜鉛 50%
及び添加物としてバレイショデンプン 含有。
- 2.性状
白色の粉末である。

●効能・効果

下記の皮膚疾患の取れん・消炎・保護・緩和な防腐
湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

●用法・用量

通常、症状に応じ1日1～数回、綿などに含ませて軽く散布して用いる。

●使用上の注意

1.副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

2.適用上の注意

使用部位：眼には使用しないこと。
 使用時：誤って吸入しないよう注意させること。

500g

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「マルイシ」

Zinc Oxide Starch Powder [Maruishi]

日本薬局方

亜鉛華デンプン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

亜鉛華デンプン「マルイシ」

製造番号

使用期限



JAN

GS1-RSS



4



(01)14987211100510

紙箱

袋: PE

500g

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「マルイシ」

Zinc Oxide Starch Powder [Maruishi]

日本薬局方

亜鉛華デンプン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

亜鉛華デンプン「マルイシ」 500g

2009年8月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ00988
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1979年2月

貯法: 室温保存

使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意: 空気中から二酸化炭素を吸収して変質する。

●禁忌(次の部位には使用しないこと)

- (1) 重度または広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]
 (2) 患部が湿潤している場所[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

●組成・性状

1. 組成
酸化亜鉛 50%
及び添加物として/バレイシヨデンプン 含有。
2. 性状
白色の粉末である。

●効能・効果

下記の皮膚疾患の取れん・消炎・保護・緩和な防腐
 湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

●用法・用量

通常、症状に応じ1日1〜数回、綿などに含ませて軽く散布して用いる。

●使用上の注意

1. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

^{注)}このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

2. 適用上の注意

使用部位: 眼には使用しないこと。
 使用時: 誤って吸入しないよう注意させること。