

レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

50mg/10mL(0.5%)

劇 ポプスカイン® 0.5%注 50mg/10mL

POPSCAINE® 0.5% inj. 50mg/10mL

10mL×10アンプル

注意—医師等の処方箋により使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩5.63mg
(レボブピバカインとして5.0mg)含有

【効能・効果】伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

製造番号

使用期限



レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

50mg/10mL(0.5%)

劇 ポプスカイン® 0.5%注 50mg/10mL

POPSCAINE® 0.5% inj. 50mg/10mL

10mL×10アンプル

注意—医師等の処方箋により使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩5.63mg
(レボブピバカインとして5.0mg)含有

【効能・効果】伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

50mg/10mL(0.5%)

劇 ポプスカイン® 0.5%注
50mg/10mL

禁 静 注

10mL×10アンプル

レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

50mg/10mL(0.5%)

劇 ポプスカイン® 0.5%注 50mg/10mL

POPSCAINE® 0.5% inj. 50mg/10mL

10mL×10アンプル

注意—医師等の処方せんにより使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩5.63mg
(レボブピバカインとして5.0mg)含有

【効能・効果】伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

製造番号

使用期限

GS1-RSS



(01)14987211752511



JAN



4

987211752514

レボブピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

50mg/10mL(0.5%)

劇 ポプスカイン® 0.5%注 50mg/10mL

POPSCAINE® 0.5% inj. 50mg/10mL

10mL×10アンプル

注意—医師等の処方せんにより使用すること

【組成】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩5.63mg
(レボブピバカインとして5.0mg)含有

【効能・効果】伝達麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

50mg/10mL(0.5%)

劇 ポプスカイン® 0.5%注

50mg/10mL

禁 静 注

10mL×10アンプル

50mg/10mL

禁 静 注

劇 ポブスカイン0.5%注
50mg/10mL

【組成】 1管(10mL)中

レボブピバカイン塩酸塩56.3mg

(レボブピバカインとして50mg)含有

【効能・効果】 伝達麻酔

【貯法】 室温保存

B

注意－医師等の処方箋
により使用すること

0.5%

Ⓡ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造番号

使用期限

ポプスカイン0.5%注

50mg/10mL



(01)04987211852511

禁 静 注

