

500mL

希塩酸「マルイシ」

Dilute Hydrochloric Acid [Maruishi]

日本薬局方

希 塩 酸

製造販売元


丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

希塩酸「マルイシ」

2014年9月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872335
承認番号	16100AMZ00962
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1984年6月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の患者には投与しないこと)

アシドーシスのある患者[症状を悪化させるおそれがある。]

●組成・性状

1.組成

塩化水素(HCl) 9.5~10.5%w/v 含有。

2.性状

無色の液で、においはなく、強い酸味がある。
比重 d_{20}^{20} ：約1.05

●効能・効果

低・無酸症における消化異常症状の改善

●用法・用量

通常成人1日量0.5~1.0mLを約200mLの水に
うすめるか、又はリモナーデ剤として1~数回に
分けて経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

1.重要な基本的注意

- (1)必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- (2)原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には
直ちに水で洗い流すこと。
- (3)眼に入らないように注意すること。
入った場合には直ちに水で洗い流し、専門医
の処置を受けること。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明
確となる調査を実施していない。

その他の副作用

長期投与：長期投与により便秘を起こすこと
がある。

3.適用上の注意

投与に際しては、歯のホーロー質をいためる
ことがあるので、ストローなどを用いるか、投与
後、炭酸水素ナトリウム水で含嗽させること。

製造番号

使用期限



キャップ：PP

ガラス：瓶

△トローコ用単位包装調剤



C01J0498721122119

△トローコ用単位包装販売



C01J1498721112119

500mL

希塩酸「マルイシ」

Dilute Hydrochloric Acid [Maruishi]

日本薬局方

希 塩 酸

製造販売元


丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

希塩酸「マルイシ」

2009年9月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872335
承認番号	16100AMZ00962
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1984年6月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の患者には投与しないこと)

アシドーシスのある患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕

●組成・性状

1.組成

塩化水素(HCl) 9.5~10.5 W/V% 含有。

2.性状

無色の液で、においはなく、強い酸味がある。

比重 d_{20}^{20} ：約1.05

●効能・効果

低・無酸症における消化異常症状の改善

●用法・用量

通常、成人1日量0.5~1.0mLを約200mLの水にうすめるか、またはリモナーゼ剤として1~数回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

1.重要な基本的注意

- (1)必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- (2)原液または濃厚液が皮膚に付着した場合には直ちに水で洗い流すこと。
- (3)眼に入らないように注意すること。
 入った場合には直ちに水で洗い流し、専門医の処置を受けること。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

長期投与：長期投与により便秘を起こすことがある。

3.適用上の注意

投与に際しては、歯のホーロー質をいためることがあるので、ストローなどを用いるか、投与後、炭酸水素ナトリウム水で含嗽させること。

製造番号

使用期限



キャップ：PP

ガラス：瓶

GS1-RSS



(01)1498721121119

JAN



4