

500g

軟膏基剤
日本薬局方マクロゴール4000
Macrogol 4000

製造販売元

Ⓔ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

マクロゴール4000

製造番号

使用期限



↑<調剤包装単位用コード>

 (01)04987211260118

↑<販売包装単位用コード>

 (01)14987211160118



500g

軟膏基剤
日本薬局方マクロゴール4000
Macrogol 4000

製造販売元

Ⓔ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

開封口

マクロゴール4000

2014年12月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	877123
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1956年5月
販売開始	1956年5月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1. 組成

本品はエチレンオキシドと水との付加重合体で、 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ で表され、 n は59～84である。

2. 性状

白色のパラフィン様の塊、薄片又は粉末で、においはないか、又はわずかに特異なにおいがある。

水に極めて溶けやすく、メタノール又はピリジンに溶けやすく、エタノール(99.5)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.0～7.5である。

●効能・効果 ●用法・用量

軟膏基剤として調剤に用いる。

500g

軟膏基剤

日本薬局方

マクロゴール4000

Macrogol 4000

マクロゴール4000

500g

軟膏基剤

日本薬局方

マクロゴール4000

Macrogol 4000

500g

500g

マクロゴール4000

2009年8月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	877123
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1956年5月
販売開始	1956年5月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品はエチレンオキシドと水との付加重合体で、 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ で表され、 n は59～84である。

2.性状

白色のパラフィンのような塊、薄片または粉末で、においはないか、またはわずかに特異なにおいがある。

水に極めて溶けやすく、メタノールまたはピリジンに溶けやすく、エタノール(99.5)またはジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.0～7.5である。

●効能・効果 ●用法・用量

軟膏基剤として調剤に用いる。

製造番号

使用期限



JAN

GS1-RSS



4



(01)14987211160118



箱

袋:PE

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

マクロゴール4000

500g



(01)04987211260118



袋



袋

PE

Ⓢ 丸石製薬株式会社