おりますので、若干性状が異なる場合もありま すが、品質に問題はありません。

1993年8月

●組成・性状 1 組成

販売開始

本品lg中 日局白色ワセリン1g 含有。

2. 性状

白色〜微黄色の全質均等の軟膏様の物質で、に おい及び味はない。水、エタノール(95)又はエタ ノール (99.5) にほとんど溶けない。 ジェチルエーテ ルに澄明又はわずかに不溶分を残して溶ける。 加温するとき、澄明な液となる。

●効能・効果●用法・用量 軟膏基剤として調剤に用いる。 また、皮膚保護剤として用いる。

●使用上の注意 副作用

> 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確 となる調査を実施していない。

	頻度不明
皮膚注	接触皮膚炎

注)このような症状があらわれた場合には 使用を中止すること。

製造番号

使用期限

軟膏基剤

日本薬局方

白色ワセリン

White Petrolatum

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

岐阜県羽島市江吉良町1593

金属:缶

15kg

軟膏基剤

日本薬局方

白色ワセリン

White Petrolatum

発売元

旬 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

2009年7月作成(第1版)
日本標準商品分類番号 877121
許可番号 21A2X00016
葉価収載 1979年1月
販売開始 1993年8月

法:室温保存

使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品1g中 日局白色ワヤリン1g 含有。

2.性状

白色〜微黄色の全質均等の軟膏ようの物質で、におい及び味はない。水、エタノール(95)またはエタノール(95)にほとんど溶けない。ジェチルエーテルに発明またはわずかに不溶分を残して溶ける。加温するとき、澄明な液となる。

効能・効果 ●用法・用量 軟膏基剤として調剤に用いる。 また、皮膚保障剤として用いる。

使用上の注意副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
皮膚注	接触皮膚炎

注)このような症状があらわれた場合には 使用を中止すること。



使用期限



金属:缶

