

鎮痒・消炎剤

500g

フェノール・亜鉛華リニメント
「ニッコー」

Phenol and Zinc Oxide Liniment「NIKKO」

日本薬局方

フェノール・亜鉛華リニメント

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 500g

2015年4月改訂（第2版）	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ01317
薬価収載	1986年3月
販売開始	1993年7月
再評価結果	1982年8月

貯法：室温保存

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

- 禁忌（次の部位には使用しないこと）
び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜

●組成・性状

1.組成

100g中 液状フェノール 2.2mL
酸化亜鉛 10g

及び添加物としてグリセリン、トラガント末、
カルメロースナトリウム 含有。

2.性状

白色ののり状で、わずかにフェノールのおいがある。

●効能・効果

皮膚癢痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ

●用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用
を中止すること。

2.適用上の注意

- (1)眼には使用しないこと。
- (2)長期間又は広範囲に使用しないこと。

製造番号

使用期限

〈調剤包装単位用コード〉



(01)04987211250928

〈販売包装単位用コード〉



(01)14987211150928

鎮痒・消炎剤

500g

フェノール・亜鉛華リニメント
「ニッコー」

Phenol and Zinc Oxide Liniment「NIKKO」

日本薬局方

フェノール・亜鉛華リニメント

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 500g

2009年6月作成(第1版)

日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ01317
薬価収載	1986年3月
販売開始	1993年7月
再評価結果	1982年8月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

- 禁忌(次の部位には使用しないこと)
び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜

●組成・性状

1.組成

100g中 液状フェノール 2.2mL
酸化亜鉛 10g及び添加物としてグリセリン、トラガント末、
カルメロースナトリウム 含有。

2.性状

白色ののり状で、わずかにフェノールのにおいがある。

●効能・効果

皮膚癢痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ

●用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用
を中止すること。

2.適用上の注意

- (1)眼には使用しないこと。
- (2)長期間または広範囲に使用しないこと。

製造番号

使用期限

