MARUISHI

500mL

日本薬局方

プロピレングリコール

Propylene Glycol

製造販売元

㊞ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

プロピレングリコール

2014年9月改訂（第2版）	
日本標準商品分類番号	877139
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1958年4月
販売開始	1958年4月

貯　　法：(1)吸湿注意
(2)室温で火気を避けて保存

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

●組成・性状

1.組成

本品1mL中　日局プロピレングリコール1mL　含有。

2.性状

無色澄明の粘稠性のある液で、においはなく、味はわずかに苦い。

水、メタノール、エタノール（95）又はピリジンと混和する。

ジエチルエーテルに溶けやすい。

本品は吸湿性である。

比重　d^{20}_{20}：1.035～1.040

●効能・効果　●用法・用量

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。

火気厳禁

第　4　類
第三石油類
水　溶　性
危険等級Ⅲ

キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PE

<販売包装単位用コード>
(01)14987211152915

<調剤包装単位用コード>
(01)04987211252915

MARUISHI

500mL

日本薬局方

プロピレングリコール

Propylene Glycol

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

プロピレングリコール

2009年7月作成（第1版）	
日本標準商品分類番号	877139
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1958年4月
販売開始	1958年4月

貯　　法：(1)吸湿注意
(2)室温で火気を避けて保存
使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

●組成・性状

1.組成
本品1mL中　日局プロピレングリコール1mL　含有。

2.性状
無色澄明の粘稠性のある液で、においはなく、味はわずかに苦い。
水、メタノール、エタノール（95）またはピリジンと混和する。
ジエチルエーテルに溶けやすい。
本品は吸湿性である。
比重　d^{20}_{20}：1.035～1.040

●効能・効果　●用法・用量

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。

火気厳禁
第三石油類
水溶性
危険等級Ⅲ

キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PE

GS1-RSS
(01)14987211152915

JAN
4 987211 152918