

ウェルアップ® 手指消毒液0.2%

【薬効薬理】

1. 本剤は使用濃度において、栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

2. ウェルアップ手指消毒液0.2%の殺菌作用

ウェルアップ手指消毒液0.2%の最小殺菌濃度(MBC)

菌種	MBC(μg/mL)*
Staphylococcus aureus IFO 13276	3.9
Escherichia coli NIHJ/C	3.9
Pseudomonas aeruginosa IFO 13275	15.6
Candida albicans IFO 1061	31.3

*MBCは、クロルヘキシジングルコン酸塩としての濃度を示す。

【取扱上の注意】

本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸塩で漂白すると、褐色のシミを生じることがあるので、漂白剤としては過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。



火気厳禁

第4類
アルコール類
水溶性
危険等級Ⅱ
エタノール

使用後、フィルムをはがしてキャップをはずした後、空容器を図のように折り目を外側に押しつぶして下さい。
(つぶした後は元に戻りません。)



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PET

使用量
目安

開封日 年 月 日

とりかえ
の目安 年 月 日

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)

ウェルアップ®
手指消毒液0.2%

WELLUP®
Antiseptic Solution for Hand 0.2%

飲用不可

注意 1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。
3. 密栓し、遮光して保存。

500mL

製造番号

使用期限

製造販売元

㊤ 丸三製薬株式会社

大坂市鶴見区今津中2-4-2

残量
目安

ウェルアップ® 手指消毒液0.2%

2014年9月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	22100AMX01379
薬品収載	未収載
販売開始	2009年8月
再評価結果	1992年6月

貯法: 遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存。

使用期限: 3年(ケース等に表示の使用期限を参照すること。)

注意: 取扱上の注意の項参照

【禁忌(次の場合には使用しないこと)】

- (1) クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) 腫、膀胱、口腔等の粘膜面
[クロルヘキシジン製剤の前記部位への使用によりショック症状(初期症状: 悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等)の発現が報告されている。]
- (3) 損傷皮膚及び粘膜
[エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【組成・性状】

1. 組成: 100mL中、
クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g(0.2%(w/v))
及び添加物としてトリスチン酸イソプロピル、エタノール、その他4成分含有。
2. 性状:
無色澄明の液で、特異なにおいがある。
メタノール又はエタノール(95)と混和する。
本品10mLはアセトン10mL以下又は水1mL以下と混和するが、溶液の量を増加するとき白濁する。
比重 d₄²⁰: 0.860~0.880

【効能・効果】

手指の消毒

【用法・用量】

本剤をうすめずにそのまま手指の消毒に用いる。
(注意: 手指の消毒における使用濃度は、クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1~0.5%であり、本剤は0.2%であるので、そのまま用いる。)

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の場合には慎重に使用すること)
 - (1) 薬物過敏症の既往歴のある患者
 - (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者。
2. 重要な基本的注意
 - (1) ショック等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏症の有無について十分な問診を行うこと。
 - (2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
 - (3) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちに水で洗うこと。
3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

 - (1) 重大な副作用

ショック(0.1%未満) があらわれることがあるので観察を十分に行い、悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (2) その他の副作用

過 敏 症 ^(注1)	頻 度 不 明	0.1% 未 満
皮膚 ^(注2)	刺 激 症 状	発疹・蕁麻疹等

注1) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。
注2) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
4. 適用上の注意

投与経路: 手指消毒以外の目的には使用しないこと。

使用時:

 - (1) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - (2) 血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分洗い落してから使用すること。
 - (3) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落とししてから使用すること。
 - (4) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。
5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%
WELLUP®
Antiseptic Solution for Hand 0.2%

【組 成】 100mL 中
クロルヘキシジングルコン酸塩…0.2g

用法・用量、使用上の注意等詳細は
容器の表示事項をご参照願います。

注意 1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。
3. 密栓し、遮光して保存。

飲用不可

火気厳禁

第 4 類
アルコール類
水 溶 性
危 険 等 級 II
エ タ ノ ール



(01)14987211560529

500mL

製造番号

使用期限

製造販売元

Ⓔ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%
WELLUP®
Antiseptic Solution for Hand 0.2%

500mL

製造販売元

Ⓔ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%

ご使用に際し添付のハンディポンプを
ご利用願えれば便利です。



ウェルアップ® 手指消毒液0.2%

【薬効薬理】

1. 本剤は使用濃度において、栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

2. ウェルアップ手指消毒液0.2%の殺菌作用 ウェルアップ手指消毒液0.2%の最小殺菌濃度(MBC)

菌種	MBC(μg/mL)*
Staphylococcus aureus IFO 13275	3.9
Escherichia coli NIH-JC	3.9
Pseudomonas aeruginosa IFO 13275	15.6
Candida albicans IFO 1061	31.3

※MBCは、クロルヘキシジングルコン酸塩としての濃度を示す。

【取扱上の注意】

本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸塩で漂白すると、褐色のシミを生じることがあるので、漂白剤としては過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。

第 4 類
アルコール類
水 溶 性
危険等級Ⅱ
エタノール

火気厳禁



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PET

使用後、フィルムをはがしてキャップをはずした後、空容器を図のようにして折り目を外側に押しつぶして下さい。
(つぶした後は元に戻りません。)



速乾性擦式手指消毒剤 (クロルヘキシジン製剤)

ウェルアップ® 手指消毒液0.2%

WELLUP®
Antiseptic Solution for Hand 0.2%

開封日

年 月 日

飲用不可

- 注意
1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
 2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。
 3. 密栓し、遮光して保存。

500mL

製造番号

使用期限

製造販売元

⑥ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

ウェルアップ® 手指消毒液0.2%

2009年7月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	22100AMX01379
薬価収載	未収載
販売開始	2009年8月
再評価結果	1992年6月

貯 法: 遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存。
使用期限: 3年(ケース等)に表示の使用期限を参照すること。
注 意: 取扱上の注意の項参照

【禁忌(次の場合には使用しないこと)】

- (1) クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) 膝、膀胱、口腔等の粘膜面
【クロルヘキシジン製剤の前記部位への使用により、ショック症状(初期症状: 悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等)の発現が報告されている。】
- (3) 損傷皮膚及び粘膜
【エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。】

【組成・性状】

1. 組成 100mL中
クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g (0.2%v/v)
及び添加物としてミリスチン酸イソプロピル、エタノール、その他4成分 含有。

2. 性状

無色澄明の液で、特異なにおいがある。
メタノールまたはエタノール(95)と混和する。
本品10mLはアセトン10mL以下または水1mL以下と混和するが、溶媒の量を増加すると白濁する。
比重 d₄²⁰: 0.860~0.880

【効能・効果】

手指の消毒

【用法・用量】

本剤をうすめずにそのまま手指の消毒に用いる。
(注意: 手指の消毒における使用濃度は、クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1~0.5%であり、本剤は0.2%であるので、そのまま用いる。)

ウェルアップ® 手指消毒液0.2%

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の場合には慎重に使用すること)
 - (1) 薬物過敏症の既往歴のある者
 - (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者。
2. 重要な基本的注意
 - (1) ショック等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
 - (2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
 - (3) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

ショック(0.1%未満)があらわれることがあるので観察を十分に行い、悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

	頻 度	不 明	0.1 % 未 満
過 敏 症 (注1)			
皮 膚 (注2)			発 疹・尋 麻 疹 等

- 注1) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。
注2) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

4. 適用上の注意

- 投与経路: 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
使用時:
 - (1) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - (2) 血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分洗い落としてから使用すること。
 - (3) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
 - (4) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%
WELLUP®
Antiseptic Solution for Hand 0.2%

【組 成】 100mL 中
クロルヘキシジングルコン酸塩…0.2g

用法・用量、使用上の注意等詳細は
容器の表示事項をご参照願います。

- 注意
1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
 2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。
 3. 密栓し、遮光して保存。

飲用不可

火気厳禁

第 4 類
アルコール類
水 溶 性
危 険 等 級 II
エ タ ノ ール

500mL

製造番号

使用期限

製造販売元
Ⓜ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%

GS1-RSS



(01)14987211560529

JAN



4 987211 560522

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%
WELLUP®
Antiseptic Solution for Hand 0.2%

500mL

製造販売元
Ⓜ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

速乾性擦式手指消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)
ウエルアツプ®
手指消毒液0.2%

ご使用に際し添付のハンディポンプを
ご利用願えれば便利です。

