

22  
22  
22  
22  
22

500g  
消化酵素剤  
ジアスターゼ原末  
「マルイシ」  
Diastase [Maruishi]

85  
古紙配合率85%再生紙を使用しています

MARUISHI

500g

消化酵素剤

ジアスターゼ原末  
「マルイシ」

Diastase [Maruishi]

日本薬局方  
ジアスターゼ

製造販売元

丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g  
消化酵素剤  
ジアスターゼ原末  
「マルイシ」

<調剤包装単位用コード>  
01104987211227524  
(01)04987211227524

製造番号

使用期限

販売包装  
単位用コード



A-2

MARUISHI

500g

消化酵素剤

ジアスターゼ原末  
「マルイシ」

Diastase [Maruishi]

日本薬局方  
ジアスターゼ

製造販売元

丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

開封口

500g  
消化酵素剤  
ジアスターゼ原末「マルイシ」

2017年9月改訂(第3版) 2014年12月改訂	
日本標準商品分類番号	872331
承認番号	22000AMX02198
薬価収載	2008年12月
販売開始	2008年12月
再評価結果	1983年4月

貯法：(1)吸湿注意  
(2)30℃以下で保存すること。  
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の患者には投与しないこと)  
本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

●組成・性状

- 組成  
本品1g中 日局ジアスターゼ1g 含有。
- 性状  
淡黄色～淡褐色の粉末である。  
吸湿性である。

●効能・効果

主として炭水化物の消化異常症状の改善

●用法・用量

ジアスターゼとして、通常成人1回0.3～0.5gを  
1日3回食後に経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確  
となる調査を実施していない。  
その他の副作用  
過敏症：発疹等の過敏症状があらわれた場合には  
投与を中止すること。

① ② ③ ④

M 92×71×135.5 (外)