

ホウ酸原末「マルイシ」
Boric Acid「Maruishi」

眼科用剤

500g

MARUISHI

500g

眼科用剤

ホウ酸原末「マルイシ」

Boric Acid「Maruishi」

日本薬局方
ホウ酸

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

R35

古紙配合率85%再生紙を使用しています

500g

ホウ酸原末「マルイシ」

<調剤包装単位用コード>



(01)04987211254124

製造番号

使用期限

販売包装
単位用コード



A-2

MARUISHI

500g

眼科用剤

ホウ酸原末「マルイシ」

Boric Acid「Maruishi」

日本薬局方
ホウ酸

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

開封口

ホウ酸原末「マルイシ」 500g

2018年6月改訂(第3版) 2014年12月改訂	
日本標準商品分類番号	871319
承認番号	22000AMX02205
薬価収載	2008年12月
販売開始	2008年12月
再評価結果	1985年7月

貯法：室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

- 組成
本品1g中 日局ホウ酸1g 含有。

- 性状
無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、僅かに特異な味がある。
温湯、熱エタノール(95)又はグリセリンに溶けやすく、水又はエタノール(95)にやや溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。
本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは3.5~4.1である。

●効能・効果

結膜囊の洗浄・消毒

●用法・用量

2%以下の濃度で用いる。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症	発疹、眼瞼炎等

このような症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。

2.適用上の注意

投与経路：眼科用にとのみ使用すること。
使用時：長期間にわたり使用しないこと。