オキシドール消毒用液「マルイシ」

オキシドール消毒用液「マルイシ」

500mL

オキシドール消毒用液「マルイシ」

- <使用上の注意続き>
- 3.適用上の注意
- 投与経路:外用にのみ使用し、内服しないこと。 使用時:
- (1)眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2)易刺激性の部位に使用する場合には、正常の 部位に使用する場合よりも低濃度とすること が望ましい。
- (3)深い創傷に使用する場合の希釈液としては 注射用蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や 精製水を用いないこと。
- 4.その他の注意
- 長期大量経口投与によりマウスの十二指腸に腫瘍の発生が認められたとの報告がある。



A-2



使用後、フィルムをはがして

MARUISHI 外用³ 年 月

500mL

 \Box

外用殺菌消毒剤

オキシドール 消毒用液 「マルイシ」

Oxydol Disinfectant Solution [Maruishi]

日本薬局方

オキシドール

製造番号

使用期限

製造販売元

⑥ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

オキシドール消毒用液「マルイシ」

2018年10月改訂(第4版) *2016年 6月改訂	
日本標準商品分類番号	872614
承認番号	21900AMX01461
薬価収載	2007年12月
販売開始	2007年12月
再評価結果	1983年4月

貯 法: 遮光し、30℃以下で保存。

使用期限:3年6ヵ月(表示の使用期限を参照すること。) 注 意:〈配合禁忌〉酸化剤、還元剤、アルカリ性に より分解する。

●禁忌(次の部位には使用しないこと) 瘻孔、挫創等本剤を使用した際に体腔にしみ込む おそれのある部が

[空気塞栓を起こしたとの報告がある。]

*●組成·性状

1.組成

過酸化水素 3W/v% 及び添加物として氷酢酸、アセトアニリド、エデト酸ナトリウム水和物、エタノール 含有。

2.性状

無色澄明の液で、においはないか、又はオゾン ようのにおいがある。

本品を放置するか、又は強く振り動かすとき、 徐々に分解する。

酸化剤又は還元剤と接触するとき、速やかに分解する。

アルカリ性にするとき、激しく泡だって分解する。 光によって変化する。

pH:3.0~5.0、比重 d架:約1.01

*●効能·効果

創傷・潰瘍の殺菌・消毒

外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの 粘膜の炎症

口腔粘膜の消毒、齲窩及び根管の清掃・消毒、歯の 清浄、口内炎の洗口 500mL

オキシドール消毒用液「マルイシ」

*●用法·用量

創傷・潰瘍:原液のままあるいは2~3倍希釈して塗布、洗浄する。

耳鼻咽喉:原液のまま塗布、滴下あるいは2~ 10倍(耳科の場合、時にグリセリン、 アルコールで希釈する)希釈して洗

浄、噴霧、含嗽に用いる。

腔: 口腔粘膜の消毒、齲窩及び根管の清掃・消毒、歯の清浄には原液又は2倍 希釈して洗浄・拭掃する。口内炎の洗口には10倍希釈して洗口する。

●使用上の注意

1.重要な基本的注意

長期間又は広範囲に使用しないこと。

2.副作月

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確 となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用

空気塞栓(頻度不明);

空気塞栓を起こすことがあるので、循環動態 に異常を認めた場合など空気塞栓が疑われる 症状がみられた場合は、速やかに本剤の使用 を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

口腔(頻度不明)

連用により口腔粘膜を刺激することがある。

< 使用 上の注意続く > オ

