

貯法：室温保存

有効期間：3年

溶解剤

日本薬局方

プロピレングリコール

Propylene Glycol

許可番号 27A2X00107

販売開始 1958年4月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	プロピレングリコール
成分	1mL中 日局プロピレングリコール1mL

3.2 製剤の性状

販売名	プロピレングリコール
性状	無色澄明の粘稠性のある液である。

4. 効能又は効果

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。

6. 用法及び用量

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。


19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：プロピレングリコール（Propylene Glycol）

分子式： $C_3H_8O_2$

分子量：76.09

化学構造式：



性状：無色澄明の粘稠性のある液で、においはなく、味は僅かに苦い。

水、メタノール、エタノール（95）又はピリジンと混和する。

ジエチルエーテルに溶けやすい。

吸湿性である。

比重 d_{20}^{20} ：1.035～1.040

20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22. 包装

500mL [ポリ容器]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2

TEL. 0120-014-561

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2