



医薬品の使用にあたっては、各医薬品の電子添文等をご参照ください。電子添文等の改訂にご留意ください。

Main table with columns for disinfectant types (Aldehyde, Peroxide, Alcohol, Quaternary Ammonium, etc.), target organisms (Bacteria, Fungi, Viruses), and application areas (Human, Instruments, Environment). Includes Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd. logo.

*1 エンペローウイルス (脂質を含む中間サイズ) : インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルス、コロナウイルス等
*2 ノンエンペローウイルス (脂質を含まない小型サイズ) : アデノウイルス、エンテロウイルス (コクサッキーウイルス等)、ノロウイルス、ロタウイルス 等
*3 HBV・HCV : 評価にバラつきがみられる記載があるものは△とした。
※ in vitroにおける試験結果に基づく (ネコカリシウイルスF-9、マウスノロウイルス、アデノウイルス5型、ロタウイルス、ポリオウイルス1型)

微生物 : ○…有効 △…十分な効果が得られないことがある (報告により評価にバラつき、長時間の作用が必要 等) ×…無効
対象物 : ○…使用可 △…部位や場合により異なる ×…使用不適 ☆…注意して使用

注1 : 消毒剤適合一覧は、消毒効果に関する各種報告、各種消毒剤の特性、効能・効果、実用性等を総合的に検討し作成しました。
注2 : #印の消毒剤は他社取扱い品です。他社該当製品の電子添文をご参照ください。