

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2024年8月  
丸石製薬株式会社

慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠

劇薬、処方箋医薬品<sup>※</sup>

# トアラセット<sup>®</sup> 配合錠「マルイシ」

## TOARASET<sup>®</sup> Combination Tablets “Maruishi”

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

®登録商標

この度、標記の弊社製品につきまして、「使用上の注意」の改訂を行いましたのでお知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない事象をご経験の際には、弊社まで速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂の概要

「10. 相互作用」における「10.2 併用注意（併用に注意すること）」の項を改訂いたしました。

### 2. 改訂内容

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 (略)			10. 相互作用 (略)		
10.1 併用禁忌（併用しないこと） (略)			10.1 併用禁忌（併用しないこと） (略)		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リネゾリド	(略)	(略)	リネゾリド	(略)	(略)
メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー）	セロトニン症候群（錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢等）があらわれるおそれがある。	メチルチオニウム塩化物水和物のモノアミン酸化酵素阻害作用によりセロトニン作用が増強される。			

部：追記箇所

PC24-002

### 3. 改訂理由

#### <自主改訂>

メチルチオニウム塩化物水和物（販売名：メチレンブルー静注 50mg「第一三共」）の電子添文との整合性を図り「10.2 併用注意（併用に注意すること）」の項に追記いたしました。

- 最新の電子添文につきましては、PMDA ホームページ及び丸石製薬株式会社ホームページに掲載しておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

URL : <https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

丸石製薬株式会社ホームページ「医療関係者向情報サイト」

URL : <https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/>

- 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて以下のバーコードを読み取ることで、PMDA ホームページ上の最新の電子添文等をご覧いただけます。



製造販売元  
**丸石製薬株式会社**  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

〈製品情報のお問い合わせ先〉  
学術情報部 TEL. 0120-014-561  
土日祝日、当社定休日を除く 9:00~17:00



医療関係者向情報サイト  
スマートフォン対応