

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p>1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p>2 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p>4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p>3 朝 透明のうわずみを使います。</p> 	<p>晩 よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p>5 患部にやさしく塗布してください。</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p>1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p>2 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p>4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p>3 朝 透明のうわずみを使います。</p> 	<p>晩 よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p>5 患部にやさしく塗布してください。</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p>1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p>2 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p>4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p>3 朝 透明のうわずみを使います。</p> 	<p>晩 よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p>5 患部にやさしく塗布してください。</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508

イオウカンフルローションを使用されている方へ

イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p>1 必ず冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p>2 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p>4 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p>3 朝 透明のうわずみを使います。</p> 	<p>晩 よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p>5 患部にやさしく塗布してください。</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>

丸石製薬株式会社

ツール：108770
201508