







# 速乾性擦式手指消毒剤

# ウエルセプ

飲めません

®:登録商標

## ウエルセプト。使用場面例

汚物、吐物を処理した後













### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は使用しないこと 手指の皮膚の治療を受けている人。
- 2. 次の部位には使用しないこと
  - (1) 損傷のある皮膚。
  - (2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

## **6** 丸石製薬株式会社

速乾性擦式手指消毒剤

第3類医薬品

## ウエルセプト

®:登録商標

販売開始 100mL×10本:2020年1月 販売開始 300mL :2013年12月 500mL :2010年3月

2023年4月現在

#### ●使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと

手指の皮膚の治療を受けている人。

- 2.次の部位には使用しないこと
  - (1)損傷のある皮膚。
  - (2)目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

#### 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を 中止し、この製品(ケース)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

#### ●効能·効果

手指·皮膚の殺菌·消毒

#### ●用法·用量

適量を消毒部位に塗布又は塗擦する。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

- (4)血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分 洗い流した後、使用すること。
- (5)外用にのみ使用し、内服しないこと。

#### ●成分·分量

100mL中 日局エタノール 83mL

及び添加物として乳酸、クエン酸水和物、硫酸亜鉛水和物、グリセリン、ミリス チン酸イソプロピル、トコフェロール酢酸エステル、ハアセチル化しょ糖含有。

#### ●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)火気に近づけないこと。
- (5)本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

#### ●包装

100mL×10本

300mL(減容容器・ポンプ添付)

500mL(減容容器・ポンプ添付)

#### 火気厳禁

#### 第4類

アルコール類(エタノール) 危険等級II

水溶性



●詳細は印刷ケース・製品容器等の表示をご参照ください。 印刷ケース・製品容器等の表示の改訂にご留意ください。

■製品に関するお問合せ先

© 丸石製薬株式会社 学術情報部 0120-014-561 ±日祝日、当社休日を除く 0120-014-561 ±日祝日、当社休日を除く 0120-017:00

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html TEL.0120-149-931 (フリーダイヤル)

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独)医療品医療機器総合機構