

# 新型コロナウイルスに対する 不活化作用が確認された (*in vitro*) 速乾性手指消毒剤の製品ラインナップ

「ウエルパス®手指消毒液0.2%」「ウエルフォーム®」「ウエルセプト®」の新型コロナウイルスに対する不活化作用について、厚生労働省設置ワーキンググループ(以下WG)が定めた公開条件を満たしたものとして、国立医薬品食品衛生研究所のホームページに掲載されました。

【公開条件】\* 1) WGが妥当性を認めた試験法である。 2) 陰性対照がある。  
3) 反応停止(中和)条件の妥当性確認を行っている。 4) 短い反応時間に3log<sub>10</sub>以上のウイルス減少。

\*出典:国立医薬品食品衛生研究所ホームページ生活衛生化学部データベース 手指消毒剤の新型コロナウイルス不活化効果 (2022年8月26日に閲覧)  
(<https://www.nihs.go.jp/dec/section2/sarscov2.html>)

## 医療用医薬品

速乾性擦式手指消毒剤

**ウエルパス®** 手指消毒液0.2%

薬価基準対象外

剤形：液剤  
包装：100mL×10  
300mL (減容容器、ポンプ添付)  
500mL (減容容器、ポンプ添付)  
1L (減容容器、ポンプ添付)  
5L (減容容器、コック添付)



## 一般用医薬品

泡の速乾性手指消毒剤

**ウエルフォーム®**

第2類医薬品



剤形：泡剤  
包装：80mL×10  
180mL  
360mL  
1L (手動・電動ディスペンサー用)

速乾性擦式手指消毒剤

**ウエルセプト®**

第3類医薬品



剤形：液剤  
包装：100mL×10  
300mL (減容容器、ポンプ添付)  
500mL (減容容器、ポンプ添付)

「注意事項等情報」等については裏面をご確認ください

速乾性擦式手指消毒剤

薬価基準対象外

# フェルパス® 手指消毒液0.2%

## WELPAS® Antiseptic Solution for Hand 0.2%

100mL×10：2019年7月作成(第1版)

300mL：2014年9月改訂(第2版)

500mL,1L,5L：2018年10月改訂(第3版)

日本標準商品分類番号	872619
承認番号	22100AMX01378
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	300mL,500mL,1L,5L：2009年9月 100mL×10：2019年12月
貯法	密栓し、火気及び直射日光を避けて保存する。
使用期限	3年(ケース等に表示の使用期限を参照すること。)
注意	1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。 2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。

## 【禁忌(次の場合には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜 [エタノールを含有するの、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

## 【組成・性状】

## 1. 組成 100mL中

ベンザルコニウム塩化物0.2g (0.2w/v%)  
及び添加物としてプロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、その他4成分含有。

## 2. 性状

エタノールを含有する無色澄明の液で、特異なにおいがある。  
本品10mLはアセトン10mL以下又は水1mL以下と混和するが、溶媒の量を増加するとき、白濁する。  
比重  $d_4^{20}$ : 0.860~0.870

## 【効能・効果】

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

## 【用法・用量】

## 1. 医療従事者の通常の手指消毒の場合

本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血漬、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落とした後、本剤による消毒を行う。

## 2. 術前・術後の術者の手指消毒の場合

手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分洗い落とす後、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

## 【使用上の注意】

## 1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤は希釈せず、**原液のまま使用**すること。
- (2) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。

## 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症	紅斑、そう痒感、浮腫等
皮膚	刺激症状

このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

## 3. 適用上の注意

投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。

使用時：

- (1) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (2) 血漬・膿汁等の有機物は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。
- (3) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- (4) 引火性、爆発性があるため、**火気には十分注意**すること。
- (5) 本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。

## 【包装】

100mL×10  
300mL(減容器、ポンプ添付)  
500mL(減容器、ポンプ添付)  
1L(減容器、ポンプ添付)  
5L(減容器、コック添付)

●詳細はケース・製品容器・ラベルの表示をご参照ください。ケース・製品容器・ラベル等の表示の改訂にご留意ください。

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先を含む)

**丸石製薬株式会社**  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

泡の速乾性手指消毒剤

第2類医薬品

# ウエルフォーム®

販売開始	80mL×10	：2016年6月
	180mL	：2012年10月
	360mL:1L(手動/電動用)	：2011年6月

2017年10月現在

## 【使用上の注意】

## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 手指の皮膚の治療を受けている人。

## 2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

## 相談すること

## 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に

相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

## 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	*80mLはケース
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすけ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

## 【効能・効果】

手指の消毒

## 【用法・用量】

そのまま手指に塗布又は塗擦

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるので、溶液の状態です長時間皮膚と接触させないこと。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

## 【成分・分量】

本剤100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩0.2g  
及び添加物としてポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリチルリチン酸、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ヒロリドンカルボン酸塩、トコフェロール酢酸エステル、エタノール含有。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になりたり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- (6) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) 使用時は、ストッパーを外すこと。(180mL, 360mLのみ)
- (8) キャップを取り外してディスペンサーに装着すること。  
(1L電動/手動ディスペンサー用のみ)

## 【包装】

80mL×10, 180mL, 360mL  
1L(手動/電動ディスペンサー用)(減容器)

## 【火気厳禁】

第4類  
アルコール類(エタノール)  
危険等級II  
水溶性

速乾性擦式手指消毒剤

第3類医薬品

# ウエルセプト®

販売開始	100mL×10	：2020年1月
	300mL	：2013年12月
	500mL	：2010年3月

2021年3月現在

## 【使用上の注意】

## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は使用しないこと

手指の皮膚の治療を受けている人。

## 2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

## 相談すること

## 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に

相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

## 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品(ケース)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

## 【効能・効果】

手指皮膚の殺菌・消毒

## 【用法・用量】

適量を消毒部位に塗布又は塗擦する。

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分洗い流した後、使用すること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

## 【成分・分量】

100mL中 日局エタノール 83mL  
及び添加物として乳酸、クエン酸水和物、硫酸亜鉛水和物、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、トコフェロール酢酸エステル、ハアセチル化しは糖含有。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になりたり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- (6) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

## 【包装】

100mL×10  
300mL(減容器、ポンプ添付)  
500mL(減容器、ポンプ添付)

## 【火気厳禁】

第4類  
アルコール類(エタノール)  
危険等級II  
水溶性