

アセトアミノフェン錠「マルイシ」

を服用される方へ

注意してください

飲み間違いに

飲み過ぎ。



服用してください

お水と一緒に

飲み忘れたら

⚠️ 決して2回分を一度に飲まないでください。

⚠️ 気がついた時に、空腹時をさけて1回分を飲んでください。

※ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。



必ず医師や薬剤師の指示を守って
正しく服用してください。





アセトアミノフェン とは…

熱を下げ、痛みをやわらげる効果があります。成人には頭痛、腰痛症、歯痛、変形性関節症、関節リウマチなどの、各種疾患及び症状における鎮痛や、急性上気道炎の解熱・鎮痛に使用されます。

次のような方は

服用前に医師・薬剤師に相談してください

- 肝臓病、または以前に肝臓病にかかったことがある方
- アルコールを日常的に多く飲む方(成人)
- 気管支喘息のある方
- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 消化性潰瘍、血液の異常、肝障害、腎障害、心機能不全、アスピリン喘息またはその既往歴がある方

アセトアミノフェンの過量服薬^(注)にご注意ください



××××××× ○○mg
アセトアミノフェン ○○mg
××××××× ○○mg

他の薬の服用を考えている方は、市販の風邪薬・痛み止めなどにもアセトアミノフェンが含まれている場合がありますので、医師・薬剤師に必ずお伝えください。

注) 医師の処方薬に加えて、市販のアセトアミノフェン含有医薬品を併用しないでください。過量服薬による副作用が発生する危険性があります。

「体がだるい」「食欲がない」「皮膚や白目が黄ばむ(黄みがかかる)」等、気になる症状があらわれた場合、医師や薬剤師に相談してください。

詳細はPMDA(医薬品医療機器総合機構)のホームページに掲載されている「患者向医薬品ガイド」を参照ください。