



アセトアミノフェン錠「マルイシ」

200mg/300mg/500mg を服用される方へ



過量服薬にご注意ください

医師が処方・指示した用量で正しく使用していますか？

1

服用間隔は
4～6時間以上空けてください



2

空腹時の使用は避けてください



3

絶対に、2回分を
一度に使用しないでください



他に、アセトアミノフェンを含む医薬品を
使用していませんか？

アセトアミノフェンを含む医療用医薬品(カロナール®等)や
一般用医薬品(市販薬)を使用している際は
医師又は薬剤師に必ずお伝えください。

(医薬品例：裏面確認)



過量服薬により
重篤な肝障害が発現するおそれがあります

気づかない内に、併用していないか、必ず事前に確認ください

「体がだるい」「食欲がない」「皮膚や白目が黄ばむ(黄みがかかる)」等
気になる症状があらわれた場合、医師や薬剤師に相談してください

アセトアミノフェンを含む主な医薬品一覧

®: 登録商標

主な医療用医薬品(処方薬)

解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン錠 200・300・500mg「マルイシ」
解熱鎮痛剤	カロナール®錠200・300・500 カロナール®細粒20%・50% カロナール®原末
小児用解熱鎮痛剤	カロナール®シロップ2% カロナール®坐剤小児用50・坐剤100・200・400
小児用解熱鎮痛剤	アルピニー®坐剤50・100・200
小児用解熱鎮痛剤	アンヒバ®坐剤小児用50mg・100mg・200mg
慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	トラムセット®配合錠
慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	トアラセット®配合錠
解熱鎮痛剤	SG配合顆粒
総合感冒剤	PL配合顆粒
感冒剤	ペレックス®配合顆粒
頭痛・鎮痛・解熱剤	カフコデ®N配合錠

主な一般用医薬品(市販薬)

解熱鎮痛薬	カロナール®A
解熱鎮痛薬	タイレノール®A
解熱鎮痛薬	ラックル®
解熱鎮痛薬	ノーシン®
解熱鎮痛薬	バファリンルナ®PM DX
解熱鎮痛薬	新セデス®錠
かぜ薬(内用)	パブロンゴールドA(微粒)
かぜ薬(内用)	新ジキニン®顆粒
かぜ薬(内用)	パイロンPL®顆粒 Pro
かぜ薬(内用)	ベンザブロック®Sプレミアム
かぜ薬(内用)	ベンザ®エースA錠
かぜ薬(内用)	新ルル®AゴールドS

製造発売元(文献請求先及び問い合わせ先を含む)

 **丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2

[製品情報お問い合わせ先]

学術情報部 TEL : 0120-014-561

[販売情報提供活動に関するご意見]

kantokubumon@maruishi-pharm.co.jp

2026年5月作成