

## 販売中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社製品『エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」100g・500g』につきまして、長年にわたりお引き立ていただきましたが、諸般の事情によりやむなく販売を中止させていただきます。ご了承くださいお知らせ申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

## 記

## 【販売中止品】

統一商品コード	品名	包装	販売中止予定時期
211-111120	エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」	100g	2019年10月上旬頃
211-111144	エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」	500g	2019年10月上旬頃

(出荷状況により若干前後いたします)

## 【経過措置告示日】

2020年3月(予定)

## 【経過措置期間満了日】

2021年3月31日(予定)

## 【同種同効品】

統一商品コード	品名	包装	薬価(円)
211-114121	dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」	500g	10%1g 7.20円

## 【参考】

下線部：相違箇所

一般名	エフェドリン塩酸塩散10%	dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%
効能・効果	○下記疾患に伴う咳嗽 気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、感冒、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺結核、上気道炎(咽喉頭炎、鼻カタル) ○鼻粘膜の充血・腫脹	○下記の疾患に伴う咳嗽 気管支喘息、感冒、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺結核、上気道炎(咽喉頭炎、鼻カタル) ○蕁麻疹、湿疹
用法・用量	l-エフェドリン塩酸塩として通常、成人1回12.5～25mg(本剤：0.125～0.25g)を、1日1～3回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	dl-メチルエフェドリン塩酸塩として通常、成人1回25～50mg(本剤0.25～0.5g)を、1日3回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。

\*効能・効果、用法・用量が一部異なっておりますので、詳細につきましては、製品添付文書等を必ずご確認ください。

以上