

2025 年 8 月

製造販売元
マグミット製薬株式会社
発売元
丸石製薬株式会社

制酸・緩下剤

(酸化マグネシウム製剤)

マグミット[®]錠 250mg・330mg・500mg

マグミット[®]細粒83%

小児に対する用法及び用量の追加承認取得のご案内

このたび、酸化マグネシウム製剤「マグミット[®]錠」及び「マグミット[®]細粒 83%」に小児に対する用法及び用量が追加承認されましたので、ご案内申し上げます。

1. 対象製品

マグミット[®]錠 250mg

マグミット[®]錠 330mg

マグミット[®]錠 500mg

マグミット[®]細粒 83%

*マグミット[®]細粒 83%は発売準備中です

2. 内容(電子添文抜粋)

※下線部改訂

6. 用法及び用量	<u>成人</u> 〈制酸剤として使用する場合〉 酸化マグネシウムとして、通常成人 1 日 0.5～1.0g を数回に分割経口投与する。 〈緩下剤として使用する場合〉 酸化マグネシウムとして、通常成人 1 日 2g を食前又は食後の 3 回に分割経口投与するか、又は就寝前に 1 回投与する。 〈尿路尿酸カルシウム結石の発生予防に使用する場合〉 酸化マグネシウムとして、通常成人 1 日 0.2～0.6g を多量の水とともに経口投与する。 なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減する。 <u>小児</u> 〈緩下剤として使用する場合〉 通常、1 歳以上の小児には酸化マグネシウムとして、1 日 20～80mg/kg を食後の 2 回に分割経口投与する。
7. 用法及び用量に関連する注意	〈緩下剤として使用する場合〉 7.1 小児は 1 日 40mg/kg を開始用量の目安とし、患者の状態に応じて適宜増減すること。[17.1.1 参照]

●詳細は最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。