

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年6月
丸石製薬株式会社

催眠鎮静剤

ミダゾラムシロップ

向精神薬（第三種向精神薬）、習慣性医薬品^{注1)}、処方箋医薬品^{注2)}

ドルミカム[®]シロップ 2mg/mL

Dormicum[®] Syrup 2mg/mL

注1) 注意-習慣性あり、注2) 注意-医師等の処方箋により使用すること

®登録商標

この度、標記の弊社製品につきまして、「使用上の注意」の改訂を行いましたのでお知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない事象をご経験の際には、弊社まで速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

ドルミカム注射液 10mg の電子添文との整合性を図るため、「10. 相互作用」における「10.2 併用注意（併用に注意すること）」の項にベルズチファンを追記いたしました。

2. 改訂内容

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 <略>			10. 相互作用 <略>		
10.1 併用禁忌（併用しないこと） <略>			10.1 併用禁忌（併用しないこと） <略>		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3Aを誘導する薬剤 <略> セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品 ベルズチファン等	本剤の作用を減弱させることがある。	CYP3Aが誘導され、本剤の代謝が促進される。	CYP3Aを誘導する薬剤 <略> セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品等	本剤の作用を減弱させることがある。	CYP3Aが誘導され、本剤の代謝が促進される。

部：追記箇所

- ・最新の電子添文につきましては、PMDA ホームページ及び丸石製薬株式会社ホームページに掲載しておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

URL : <https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

丸石製薬株式会社ホームページ「医療関係者向け情報サイト」

URL : <https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/>

- ・添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて以下のバーコードを読み取ることで、PMDA ホームページ上の最新の電子添文等をご覧いただけます。

ドルミカムシロップ 2mg/mL



(01)14987211763104

製造販売元

 **丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2

〈製品情報のお問い合わせ先〉

学術情報部 TEL. 0120-014-561

土日祝日、当社定休日を除く 9:00~17:00



医療関係者向け情報サイト
スマートフォン対応