

エタノール含浸綿

開封日： 年 月 日



4cm×4cm 200枚

第3類医薬品

火 気 厳 禁

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと。

・粘膜、目の周囲、創傷面

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

①医師の治療を受けている人。②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

③患部が広範囲の人。④深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【成分・分量】

有効成分	76.9～81.4vol% エタノール (C ₂ H ₆ O) 240mL
添 加 物	イソプロパノール
そ の 他	脱脂綿 (4cm×4cm, 200枚) 48g



【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒


【用法・用量】

そのまま塗擦、洗浄用として用いる

【用法・用量に関連する注意】及び「保管及び取扱い上の注意」は裏面をご覧ください。



製造
番号
使用
期限



発売元

⑤ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (2) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (3) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 外用にのみ使用すること。
- (6) アルコール分がたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。
- (7) 薬液の蒸発を防ぐため、開封後はすみやかに使用すること。又、容器のフタを必ず閉めること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 綿の表面又は内部の小さなしみのような黒又は黄色の斑点状のものは、ワタの種子である(変質したものではない。)

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報部

大阪市鶴見区今津中2-4-2 TEL.0120-014-561

®登録商標

A-1

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)